

СРАВНЕНИЕ ВЕСОВЫХ КЛАССОВ
АНАЛИТИЧЕСКИХ В КРУГЕ ФУНКЦИЙ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕВАНЛИННЫ И ДЖРБАШЯНА

Е.Г. Родикова, К.В. Кислакова.[orcid.pdf](#)

Abstract: The central concept of R. Nevanlinna's theory of meromorphic functions is the concept of characteristic function. In complex analysis, classes of functions of bounded type and Nevanlinna-Dzhrbashyan classes, introduced in R. Nevanlinna's monograph, are well known. These classes and their analytic subclasses played an important role in the development of the theory of functions of a complex variable. In 1964, M. Dzhrbashyan attempted to generalize R. Nevanlinna's harmonious theory by introducing a new characteristic function and classes of meromorphic functions with bounded α -characteristic. It turned out that the introduced classes are wider than the Nevanlinna-Dzhrbashyan classes. Developing Nevanlinna's theory, F.A. Shamoyan in 1999 introduced and studied classes of meromorphic functions with R. Nevanlinna characteristic from L^p -weighted spaces. The connection between Shamoyan's classes and Dzhrbashyan's weight classes is studied in this paper.

RODIKOVA, E.G., KISLAKOVA, K.V., COMPARISON OF WEIGHT CLASSES OF ANALYTICAL FUNCTIONS IN A CIRCLE WITH RESTRICTIONS ON THE NEVANLINNA AND DZHRBASHYAN CHARACTERISTICS.

© 2025 Родикова Е.Г., Кислакова К.В..

Поступила 30 октября 2024 г., опубликована ??? марта 2025 г.

Keywords: analytic functions, Nevanlinna's characteristic, Dzhrbashyan's α -characteristic, differential operator.

1 Введение

Пусть \mathbb{C} - комплексная плоскость, D - единичный круг на \mathbb{C} , $H(D)$ - множество всех функций, аналитических в D , $h(D)$ — множество всех функций, гармонических в D , $a^+ = \max(0, a)$, $a^- = \max(0, -a)$, $a \in \mathbb{R}$. Обозначим через $T(r, f)$ характеристику Р. Неванлинны функции $f \in H(D)$ [3], а через $T_\alpha(r, f)$ — α -характеристику М.М. Джрбашяна [1]:

$$T(r, f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \ln^+ |f(re^{i\varphi})| d\varphi,$$

$$T_\alpha(r, f) = \frac{r^{-(\alpha+1)}}{2\pi \cdot \Gamma(\alpha+1)} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_0^r (r-t)^\alpha \ln |f(te^{i\varphi})| dt \right)^+ d\varphi, \alpha > -1,$$

где Γ — функция Эйлера.

Отметим, что α -характеристика была введена М.М. Джрбашяном в 1964 г. при обобщении им теории Р. Неванлинны, краеугольным камнем которой является понятие характеристичекой функции: $\lim_{\alpha \rightarrow -1} T_\alpha(r, f) = T(r, f)$.

Для множества $E \subset \mathbb{C}$ и функций $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ будем писать $f(\zeta) \lesssim g(\zeta)$, $\zeta \in E$, если существует постоянная $C > 0$, для которой $f(\zeta) \leq Cg(\zeta)$ для всех $\zeta \in E$.

При любом $\alpha > -1$ справедливо неравенство:

$$\sup_{0 < r < 1} T_\alpha(r, f) \lesssim \int_0^1 (1-r)^\alpha T(r, f) dr,$$

поэтому введённый М. Джрбашяном класс аналитических функций в круге, имеющих там ограниченную α -характеристику, шире класса Неванлинны-Джрбашяна $S_\alpha = \{f \in H(D) : \int_0^1 (1-r)^\alpha T(r, f) dr < +\infty\}$, введённого Р. Неванлинной в [3].

Обозначим Ω — множество всех измеримых положительных функций на $\Delta = (0, 1]$, для которых существуют числа m_ω, q_ω из Δ , M_ω такие, что (см. [8, с. 7])

$$m_\omega \leq \frac{\omega(\lambda r)}{\omega(r)} \leq M_\omega, r \in \Delta, \lambda \in [q_\omega, 1]. \quad (1)$$

Простейшими примерами таких функций могут служить $\omega(t) = t^\gamma (\ln \dots \ln \frac{e}{t})^\beta$, $t \in \Delta$, $\gamma > -1$, $\beta \in \mathbb{R}$.

Обозначим через L_ω^p , $0 < p < +\infty$ весовое пространство измеримых в D функций g таких, что

$$\left(\int_0^1 \omega(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |g(re^{i\theta})| d\theta \right)^p r dr \right)^{1/p} < +\infty,$$

$$A_\omega^p = L_\omega^p \cap H(D), \quad h_\omega^p = L_\omega^p \cap h(D).$$

Пусть $\omega \in \Omega$, $0 < p < +\infty$, $\alpha > -1$, $\beta > -1$. Введём в рассмотрение следующие классы функций:

$$N_{\omega,\alpha}^p = \left\{ f \in H(D) : \int_0^1 \omega(1-r) T_\alpha^p(r, f) dr < +\infty \right\},$$

$$S_{\omega,\beta}^p = \left\{ f \in H(D) : \int_0^1 (1-r)^\beta \omega(1-r) T^p(r, f) dr < +\infty \right\}.$$

Впервые классы $S_{\omega,0}^p$ были введены и исследованы Ф.А. Шамоном в 1999 г. в работе [5] как обобщение хорошо известных в научной литературе классов Неванлинны-Джрбашяна [3]. Классы $N_{\omega,\alpha}^p$ при $\omega(t) = t^\gamma$, $\gamma > -1$, были введены и исследованы в работе первого автора [4].

В работе [7] установлено, что при $\omega(t) = t^\gamma$, $\gamma > -1$, классы $N_{\omega,\alpha}^p$ и $S_{\omega,(\alpha+1)p}^p$ совпадают для всех $0 < p < +\infty$, $\alpha > -1$. Мы распространяем этот результат на произвольные весовые функции $\omega \in \Omega$:

Теорема 1. *Классы $N_{\omega,\alpha}^p$ и $S_{\omega,(\alpha+1)p}^p$ совпадают при всех $0 < p < +\infty$, $\alpha > -1$.*

Как следствие доказанной теоремы, мы найдём условия, при которых класс $N_{\omega,\alpha}^p$ инвариантен относительно оператора дифференцирования.

2 Формулировка и доказательство вспомогательных утверждений

Для доказательства основного результата нам потребуется вспомогательное утверждение, являющееся следствием теоремы 2, установленной в работе [7].

Теорема 2. *При всех $0 < p < +\infty$, $\alpha > -1$ справедливо следующее вложение: $S_{\omega,(\alpha+1)p}^p \subset N_{\omega,\alpha}^p$.*

Обозначим Z_f – множество всех нулей нетривиальной функции $f \in H(D)$, $n(r) = \text{card}\{z_k : |z_k| < r\}$ – количество точек последовательности $\{z_k\}_1^\infty$ в круге $|z| < r < 1$ с учётом их кратностей.

Для любого $\beta > -1$ символом $\pi_\beta(z, z_k)$ будем обозначать бесконечное произведение М.М. Джрбашяна с нулями в точках последовательности $\{z_k\}_1^{+\infty} \subset D$, $0 < |z_k| \leq |z_{k+1}| < 1$, $k = 1, 2, \dots$ (см. [1], также [8, с. 97]).

Из теоремы 4.1 и леммы 4.2 монографии [8] следует:

Теорема 3. Если $\{z_k\}_1^\infty = Z_f$ для произвольной функции $f \in S_{\omega,(\alpha+1)p}^p$, то

$$\int_0^1 \omega(1-r)n^p(r)(1-r)^{(\alpha+2)p} dr < +\infty. \quad (2)$$

Обратно, если (2) выполняется, то можно построить произведение Джрбашяна $\pi_\beta(z, z_k)$, $\beta > \alpha + 1 + \frac{\alpha_\omega+1}{p}$, из класса $S_{\omega,(\alpha+1)p}^p$ с нулями в точках $\{z_k\}_1^\infty$.

Следуя М.М. Джрбашяну (см. [1]), определим также функцию

$$n_\alpha(r) = \frac{r^{-(\alpha+1)}}{\Gamma(\alpha+2)} \int_0^r (r-t)^{\alpha+1} \cdot \frac{n(t) - n(0)}{t} dt + \frac{n(0)}{\Gamma(\alpha+2)} (\ln r - k_\alpha), \quad (3)$$

где $n(0)$ — кратность нуля в точке $z = 0$, $k_\alpha = \alpha \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+\alpha)}$, $\alpha > -1$.

Аналогичным образом, как в работе Е.Г. Родиковой [4], можно установить следующее утверждение:

Теорема 4. Если $\{z_k\}_1^\infty = Z_f$ для произвольной функции $f \in N_{\omega,\alpha}^p$, то

$$\int_0^1 \omega(1-r)n_\alpha^p(r) dr < +\infty. \quad (4)$$

Обратно, если (4) выполняется, то можно построить произведение Джрбашяна $\pi_\beta(z, z_k)$, $\beta > \alpha + 1 + \frac{\alpha_\omega+1}{p}$, из класса $N_{\omega,\alpha}^p$ с нулями в точках $\{z_k\}_1^\infty$.

При доказательстве этой теоремы существенную роль играет следующее утверждение:

Лемма 1. Из сходимости интеграла (4) следует сходимость интеграла (2).

Доказательство. Для краткости обозначим

$$I_N = \int_0^1 \omega(1-r)n_\alpha^p(r) dr,$$

$$I_S = \int_0^1 \omega(1-r)n^p(r)(1-r)^{(\alpha+2)p} dr.$$

По определению

$$\begin{aligned} I_N &= \left(\frac{1}{\Gamma(\alpha+2)} \right)^p \int_0^1 \omega(1-r)r^{-(\alpha+1)p} \left(\int_0^r (r-t)^{\alpha+1} \frac{n(t)}{t} dt \right)^p dr = \\ &= \left(\frac{1}{\Gamma(\alpha+2)} \right)^p \int_0^1 \omega(1-r) \left(\int_0^1 (1-u)^{\alpha+1} \frac{n(ur)}{u} du \right)^p dr. \end{aligned}$$

Оценим последний интеграл снизу.

$$\begin{aligned} I_N &\geq \int_{1/3}^1 \omega(1-r) \left(\int_{1-\frac{1-r}{2r}}^1 (1-u)^{\alpha+1} n(ur) du \right)^p dr \geq \\ &\geq \tilde{c}_\alpha \int_{1/3}^1 n^p \left(\frac{3r-1}{2} \right) \omega(1-r)(1-r)^{(\alpha+2)p} dr = \\ &= c_\alpha \int_0^1 n^p(\rho) \omega(1-\rho)(1-\rho)^{(\alpha+2)p} d\rho = I_S. \end{aligned}$$

Таким образом, получаем, что если $I_N < +\infty$, то и $I_S < +\infty$. Лемма доказана. \square

Из теоремы 4 следует

Теорема 5. *Всякая функция $f \in N_{\omega, \alpha}^p$ с нулями в точках последовательности $\{z_k\}$, $f(0) \neq 0$, представима в виде:*

$$f(z) = \pi_\beta(z, z_k) \cdot \exp g(z), \quad (5)$$

где $\beta > \alpha + 1 + \frac{\alpha_\omega + 1}{p}$, $\exp g(z) \in N_{\omega, \alpha}^p$ при всех $0 < p < +\infty$, $\alpha > -1$.

3 Доказательство основных результатов статьи

Доказательство. Докажем теорему 1. Итак, для того чтобы установить включение $S_{\omega, (\alpha+1)p}^p \supset N_{\omega, \alpha}^p$, нам достаточно показать, что функция $G(z) = \exp g(z) = \exp(u(z) + iv(z))$ из представления (5), принадлежит классу $S_{\omega, (\alpha+1)p}^p$ при всех $0 < p < +\infty$, $\alpha > -1$.

Для этого нужно установить оценку

$$\int_0^1 \omega(1-r)(1-r)^{p(\alpha+1)} T^p(r, G) dr \lesssim \int_0^1 \omega(1-r) T_\alpha^p(r, G) dr. \quad (6)$$

Пусть $\omega_1(1-r) = \omega(1-r)(1-r)^{p(\alpha+1)}$. Обозначим

$$A(G) = \int_0^1 \omega(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_0^1 (1-t)^\alpha u(tre^{i\varphi}) dt \right)^+ d\varphi \right)^p dr < +\infty, \quad (7)$$

$$B(G) = \int_0^1 \omega_1(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} \ln^+ |G(re^{i\theta})| d\theta \right)^p dr. \quad (8)$$

Требуемую оценку можно переписать в эквивалентном виде:

$$B(G) \lesssim A(G).$$

Учитывая, что функция $u_\alpha(z) = \int_0^1 (1-t)^\alpha u(tre^{i\varphi}) dt$ является гармонической в D (см. [2, с. 596]), и применяя теорему о среднем, получим

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u_\alpha(re^{i\varphi}) d\varphi = u_\alpha(0) = \frac{u(0)}{\alpha+1}.$$

Поэтому, используя равенство

$$\begin{aligned} u_\alpha(re^{i\varphi}) &= \max(u_\alpha(re^{i\varphi}), 0) - \max(-u_\alpha(re^{i\varphi}), 0) = \\ &= u_\alpha^+(re^{i\varphi}) - u_\alpha^-(re^{i\varphi}), \end{aligned}$$

получаем

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_0^1 (1-t)^\alpha u(rte^{i\varphi}) dt \right)^- d\varphi = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_0^1 (1-t)^\alpha u(rte^{i\varphi}) dt \right)^+ d\varphi - u_\alpha(0). \end{aligned}$$

Из последнего равенства и из (7) получаем

$$\int_0^1 \omega(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} \left| \int_0^1 (1-t)^\alpha u(rte^{i\varphi}) dt \right| d\varphi \right)^p dr \leq 2A(G) < +\infty.$$

Таким образом, функция $u_\alpha(z)$ принадлежит классу h_ω^p , $0 < p < +\infty$. По теореме 2.8 (см. [8]) гармоническая функция $v_\alpha(z)$, сопряженная с u_α , тоже принадлежит классу h_ω^p . Следовательно, функция $G_\alpha(z) = u_\alpha(z) + iv_\alpha(z)$, $z \in D$, принадлежит классу A_ω^p , т.е.

$$\int_0^1 \omega(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(re^{i\varphi})| d\varphi \right)^p dr < +\infty. \quad (9)$$

Итак, установлено, что из сходимости интеграла $A(G)$ следует сходимость (9). Теперь покажем, что из (9) следует, что интеграл $B(G)$ сходится.

Используя представление (7), нетрудно заметить, что

$$G_\alpha(z) = \int_0^1 (1-t)^\alpha \ln G(tz) dt, \quad z \in D, \quad (10)$$

где выбрана однозначная ветвь логарифмической функции, положительная на положительной полуоси.

Пусть $\tilde{G} = \ln G(w) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k w^k$, $w \in D$, тогда

$$\begin{aligned} G_\alpha(z) &= \sum_{k=0}^{+\infty} a_k z^k \int_0^1 (1-t)^{\alpha+k} dt = \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\Gamma(\alpha+1)\Gamma(k+1)}{\Gamma(\alpha+k+2)} a_k z^k = \frac{1}{\alpha+1} D^{-(\alpha+1)} \tilde{G}(z), \quad z \in D. \end{aligned}$$

По свойству интегро-дифференциальных операторов (см. [2, с. 594])

$$\tilde{G}(z) = (\alpha+1) D^{\alpha+1} G_\alpha(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbf{D}} \frac{G_\alpha(t)}{(1-\bar{t}z)^{\alpha+2}} dm_2(t).$$

По теореме 2.2 [8],

$$G_\alpha(t) = \frac{\gamma+1}{\pi} \int_{\mathbf{D}} \frac{(1-|\zeta|^2)^\gamma G_\alpha(\zeta)}{(1-\bar{\zeta}t)^{\gamma+2}} dm_2(\zeta),$$

где γ — произвольное, такое, что $\gamma > \frac{\alpha_\omega+1}{p} + 1$. С учётом этого представления аналогичным образом, как в [7, с. 155], получим:

$$|\tilde{G}(z)| \lesssim \int_{\mathbf{D}} \frac{(1-|\zeta|^2)^\gamma |G_\alpha(\zeta)|}{|1-\bar{\zeta}z|^{\gamma+3+\alpha}} dm_2(\zeta).$$

Докажем, что

$$\int_0^1 \omega_1(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |\tilde{G}(re^{i\varphi})| d\varphi \right)^p dr < +\infty, \quad (11)$$

если (9) сходится; тогда и $B(G)$ также будет сходиться, ввиду того, что $a^+ \leq |a| = a^+ + a^-$ при всех $a \in \mathbb{R}$.

Оценим интеграл

$$J(r) = \int_{-\pi}^{\pi} |\tilde{G}(re^{i\varphi})| d\varphi.$$

Учитывая хорошо известную оценку (см., например [8, с. 37]), получаем

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \tilde{G}(re^{i\varphi}) \right| d\varphi &\lesssim \int_{\mathbf{D}} \frac{(1-|\zeta|^2)^\gamma |G_\alpha(\zeta)|}{(1-r|\zeta|)^{\gamma+\alpha+2}} dm_2(\zeta) = \\ &= \left(\int_0^1 \frac{(1-\rho^2)^\gamma}{(1-\rho r)^{\gamma+\alpha+2}} \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi d\rho \right) \\ &= \int_0^r \dots + \int_r^1 \dots = I_1(r) + I_2(r). \end{aligned}$$

Предположим сначала, что $1 < p < +\infty$. Учитывая неравенство $(a+b)^p \leq 2^p(a^p+b^p)$, справедливое при всех положительных значениях a, b, p , получим:

$$\int_0^1 \omega_1(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} \left| \tilde{G}(re^{i\varphi}) \right| d\varphi \right)^p dr \lesssim \left(\int_0^1 \omega_1(1-r) I_1^p(r) dr + \int_0^1 \omega_1(1-r) I_2^p(r) dr \right). \quad (12)$$

Оценим каждый из этих интегралов по отдельности.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \omega_1(1-r) I_2^p(r) dr &= \int_0^1 \omega_1(1-r) \left(\int_r^1 \frac{(1-\rho^2)^\gamma}{(1-\rho r)^{\gamma+\alpha+2}} \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi d\rho \right)^p dr \leq \\ &\leq \int_0^1 \omega_1(1-r) \frac{1}{(1-r)^{p(\gamma+\alpha+2)}} \left(\int_r^1 (1-\rho^2)^\gamma \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p dr \lesssim \\ &\lesssim \int_0^1 \omega(1-r)(1-r)^{-p(\gamma+1)} \left(\int_r^1 (1-\rho)^\gamma \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi d\rho \right)^p dr \end{aligned}$$

Во внутреннем интеграле применим неравенство Гёльдера с весом $(1-\rho)^\gamma$:

$$\begin{aligned} \left(\int_r^1 (1-\rho)^\gamma \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi d\rho \right)^p &\leq \int_r^1 (1-\rho)^\gamma \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p d\rho \times \\ &\times \left(\int_r^1 (1-\rho)^\gamma d\rho \right)^{p/q}, \end{aligned}$$

где $q = \frac{p}{p-1}$; следовательно,

$$\left(\int_r^1 (1-\rho)^\gamma \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi d\rho \right)^p \leq (1-r)^{(\gamma+1)(p-1)} \int_r^1 (1-\rho)^\gamma \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p d\rho.$$

Таким образом, получаем

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \omega_1(1-r) I_2^p(r) dr = \\ &= \int_0^1 \omega(1-r)(1-r)^{-p(\gamma+1)} \left(\int_r^1 (1-\rho)^\gamma \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi d\rho \right)^p dr \lesssim \\ & \lesssim \int_0^1 \omega(1-r)(1-r)^{-(\gamma+1)} \int_r^1 (1-\rho)^\gamma \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p d\rho dr. \end{aligned}$$

Поменяв порядок интегрирования в последнем интеграле, получаем:

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \omega_1(1-r) I_2^p(r) dr \lesssim \\ & \lesssim \int_0^1 \omega(1-\rho) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p d\rho. \end{aligned}$$

Используя тот факт, что является интеграл $\psi(\rho) = \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi$ является монотонно растущей функцией от ρ как среднее значение субгармонической функции на окружности, приступим к оценке интеграла

$$\int_0^1 \omega_1(1-r) I_1^p(r) dr.$$

Имеем:

$$\begin{aligned}
 & \int_0^1 \omega_1(1-r) \left(\int_0^r \frac{(1-\rho^2)^\gamma}{(1-\rho r)^{\gamma+\alpha+2}} \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi d\rho \right)^p dr \leq \\
 & \leq \int_0^1 \omega_1(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(re^{i\varphi})| d\varphi \right)^p \cdot \left(\int_0^r \frac{(1-\rho^2)^\gamma}{(1-\rho r)^{\gamma+\alpha+2}} d\rho \right)^p dr \lesssim \\
 & \lesssim \int_0^1 \omega(1-r)(1-r)^{p(\alpha+1)} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(re^{i\varphi})| d\varphi \right)^p \left(\frac{1}{(1-r)^{\alpha+1}} \right)^p dr = \\
 & = \int_0^1 \omega(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(re^{i\varphi})| d\varphi \right)^p dr.
 \end{aligned}$$

Итак, (12) принимает вид:

$$\begin{aligned}
 & \int_0^1 \omega_1(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |\tilde{G}(re^{i\varphi})| d\varphi \right)^p dr \lesssim \\
 & \lesssim \int_0^1 \omega(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(re^{i\varphi})| d\varphi \right)^p dr.
 \end{aligned}$$

Теорема доказана при $1 < p < +\infty$.

Перейдем к установлению аналогичной оценки при $0 < p \leq 1$. Снова используем разбиение внутреннего интеграла на части (12).

Оценим $I_2(r)$:

$$\begin{aligned}
 I_2(r) &= \int_r^1 \frac{(1-\rho^2)^\gamma}{(1-\rho r)^{\gamma+\alpha+2}} \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi d\rho \leq \\
 &\leq \frac{2^\gamma}{(1-r)^{\gamma+\alpha+2}} \int_r^1 (1-\rho)^\gamma \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi d\rho.
 \end{aligned}$$

Предположим, что $r_n \leq r < r_{n+1}$, где $r_k = 1 - \frac{1}{2^k}$, $k = 0, 1, \dots$. Тогда

$$I_2(r) \lesssim (1-r)^{-(\gamma+\alpha+2)} \cdot \sum_{k=n}^{+\infty} \int_{r_k}^{r_{k+1}} (1-\rho)^\gamma \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi d\rho.$$

Учитывая неравенство $(a + b)^p \leq (a^p + b^p)$, справедливое при всех положительных значениях a, b и $0 < p \leq 1$, получим:

$$\begin{aligned} I_2^p(r) &\leq (1-r)^{-p(\gamma+\alpha+2)} \cdot \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\int_{r_k}^{r_{k+1}} (1-\rho)^\gamma \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi d\rho \right)^p = \\ &= (1-r)^{-p(\gamma+\alpha+2)} \cdot \sum_{k=n}^{+\infty} J_k, \end{aligned}$$

где

$$J_k = \left(\int_{r_k}^{r_{k+1}} (1-\rho)^\gamma \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi d\rho \right)^p, \quad n \leq k < +\infty, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Перейдем к оценке интегралов J_k при фиксированном k . Учитывая, что функция $\psi(\rho) = \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi$ - монотонно растущая по ρ , получаем

$$\begin{aligned} J_k &\leq \frac{1}{(\gamma+1)^p} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(r_{k+1} e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p \left[\frac{1}{2^{k(\gamma+1)}} - \frac{1}{2^{(k+1)(\gamma+1)}} \right]^p = \\ &= \left(\frac{2^{\gamma+1} - 1}{2^{\gamma+1}(\gamma+1)} \right)^p \cdot \frac{1}{2^{k(\gamma+1)p}} \cdot \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(r_{k+1} e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p = \\ &= c_{\gamma,p}^{(1)} \cdot \frac{1}{2^{k(\gamma+1)p}} \cdot \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(r_{k+1} e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p = \\ &= \frac{c_{\gamma,p}^{(1)}}{c_{\gamma,p}^{(2)}} \left(\int_{r_{k+1}}^{r_{k+2}} (1-\rho)^{(\gamma+1)p-1} d\rho \right) \cdot \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(r_{k+1} e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p, \end{aligned}$$

где $c_{\gamma,p}^{(2)} = \frac{2^{(\gamma+1)p-1}}{2^{2(\gamma+1)p(\gamma+1)p}}$. Продолжим оценку, вновь учитывая, что функция $\psi(\rho)$ - монотонно растущая:

$$J_k \leq \tilde{c}_{\gamma,p} \int_{r_{k+1}}^{r_{k+2}} (1-\rho)^{(\gamma+1)p-1} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p d\rho,$$

где $\tilde{c}_{\gamma,p} = \frac{c_{\gamma,p}^{(1)}}{c_{\gamma,p}^{(2)}}$ не зависит от k .

Вернёмся к оценке $I_2^p(r)$:

$$I_2^p(r) \leq \frac{\tilde{c}_{\gamma,p}}{(1-r)^{p(\gamma+\alpha+2)}} \sum_{k=n}^{+\infty} \int_{r_{k+1}}^{r_{k+2}} (1-\rho)^{(\gamma+1)p-1} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p d\rho,$$

где $\tilde{c}_{\gamma,p}$ не зависит от k .

Таким образом,

$$I_2^p(r) \lesssim \frac{1}{(1-r)^{p(\gamma+\alpha+2)}} \int_r^1 (1-\rho)^{(\gamma+1)p-1} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p d\rho.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \omega_1(1-r) I_2^p(r) dr \lesssim \\ & \lesssim \int_0^1 \frac{\omega(1-r)}{(1-r)^{p(\gamma+1)}} \int_r^1 (1-\rho)^{(\gamma+1)p-1} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p d\rho dr \lesssim \\ & \lesssim \int_0^1 \frac{\omega(1-r)}{(1-r)^{p(\gamma+1)}} \left[\int_r^1 \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p d(1-\rho)^{(\gamma+1)p} \right] dr. \end{aligned}$$

Проинтегрировав по частям во внутреннем интеграле, получим:

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \omega_1(1-r) I_2^p(r) dr \lesssim \\ & \lesssim \int_0^1 \omega(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi \right)^p dr. \end{aligned}$$

Для доказательства теоремы остается получить аналогичную оценку для интеграла

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \omega_1(1-r) I_1^p(r) dr = \\ & = \int_0^1 \omega_1(1-r) \left(\int_0^r \frac{(1-\rho^2)^\gamma}{(1-r\rho)^{\gamma+\alpha+2}} \int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(\rho e^{i\varphi})| d\varphi d\rho \right)^p dr. \end{aligned}$$

Снова используя монотонность функции $\psi(\rho)$ на Δ , имеем

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \omega_1(1-r)I_1^p(r)dr \lesssim \\ & \lesssim \int_0^1 \omega(1-r)(1-r)^{(\alpha+1)p} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(re^{i\varphi})| d\varphi \right)^p \left(\int_0^r \frac{(1-\rho^2)^\gamma}{(1-r\rho)^{\gamma+\alpha+2}} d\rho \right)^p dr \lesssim \\ & \lesssim \int_0^1 \omega(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(re^{i\varphi})| d\varphi \right)^p dr. \end{aligned}$$

Итак, при $0 < p \leq 1$ (12) принимает вид:

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \omega_1(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |\tilde{G}(re^{i\varphi})| d\varphi \right)^p dr \lesssim \\ & \lesssim \left(\int_0^1 \omega_1(1-r)I_1^p(r)dr + \int_0^1 \omega_1(1-r)I_2^p(r)dr \right) \lesssim \\ & \lesssim \int_0^1 \omega(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(re^{i\varphi})| d\varphi \right)^p dr. \end{aligned}$$

Таким образом, при всех $0 < p < +\infty$ установлено:

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \omega_1(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |\tilde{G}(re^{i\varphi})| d\varphi \right)^p dr \lesssim \\ & \lesssim \int_0^1 \omega(1-r) \left(\int_{-\pi}^{\pi} |G_\alpha(re^{i\varphi})| d\varphi \right)^p dr, \end{aligned}$$

то есть из сходимости (9) следует сходимость (11), откуда и следует требуемая оценка (6).

Теорема доказана полностью. \square

С помощью доказанной теоремы многие результаты, установленные для классов $S_{\omega,0}^p = S_\omega^p$ легко переносятся на классы $N_{\omega,\alpha}^p$. В частности, справедливо следующее утверждение:

Следствие 1. Пусть $\alpha > -1$, $0 < p < +\infty$, $\omega \in \Omega$. Класс $N_{\omega,\alpha}^p$ инвариантен относительно оператора дифференцирования тогда и только тогда, когда $\int_0^1 \omega(t)t^{(\alpha+1)p} \ln^p \frac{1}{t} dt < +\infty$.

Доказательство. Отметим, что если $\omega \in \Omega$, то $\omega_1(t) = \omega(t)t^{(\alpha+1)p}$ также будет принадлежать классу Ω . По теореме 1 классы $N_{\omega,\alpha}^p$ и $S_{\omega,(\alpha+1)p}^p$ совпадают при всех $0 < p < +\infty$, $\alpha > -1$, то есть класс $N_{\omega,\alpha}^p$ эквивалентен классу $S_{\omega_1}^p = \{f \in H(D) : \int_0^1 \omega_1(1-r)T^p(r, f)dr < +\infty\}$. Но по теореме 1, п.1) работы [6] (см. также [8, с. 149], теорема 4.6) класс $S_{\omega_1}^p$ инвариантен относительно оператора дифференцирования тогда и только тогда, когда $\int_0^1 \omega_1(t) \ln^p \frac{1}{t} dt < +\infty$, откуда и следует требуемое утверждение. \square

Благодарности. Авторы благодарят рецензента за внимательное чтение рукописи и ценные замечания.

References

- [1] Dzhrbashyan M. M., *The parametric representation of some general classes of meromorphic functions in the unit circle*, Doklady Academy nauk SSSR, 157:5 (1964), 1024–1027.
- [2] Dzhrbashyan M. M., *Integral transformations and representations of functions in the complex domain*, Nauka, GITTL, M., 1966.
- [3] Nevanlinna R., *Single-valued analytical functions*, GITTL, M.-L., 1941.
- [4] Rodikova E. G., *Factorization representation and description of zero sets of one class of analytic functions in a disk*, Siberian Electron. Math. Rep., (2014), 52-63.
- [5] Shamoyan F. A., *Parametric representation and description of the root sets of weighted classes of functions holomorphic in the disk*, Siberian Math. J., **40**:6 (1999), 1211–1229.
- [6] Shamoyan F. A., Kursina I. S., *On the invariance of some classes of holomorphic functions under integral and differential operators*, J. Math. Sci. (New York), **107**:4 (2001), 4097–4107.
- [7] Shamoyan F.A., Bednazh V.A., Karbanovich O.V., *On classes of functions analytic in a disk with R. Nevanlinna characteristic and α -characteristic from weighted L^p spaces*, Siberian Electron. Math. Reports, **12** (2015), 150–167.
- [8] Shamoyan F. A., *Weighted spaces of analytic functions with mixed norm*, Bryansk State University, Bryansk, 2014.

EUGENIA GENNADEVNA RODIKOVA
 BRYANSK STATE UNIVERSITY,
 STR. BEZHITSKAYA, 14,
 241036, BRYANSK, RUSSIA
 Email address: evheny@yandex.ru

KSENIYA VASILEVNA KISLAKOVA
 BRYANSK STATE UNIVERSITY,
 STR. BEZHITSKAYA, 14,
 241036, BRYANSK, RUSSIA
 Email address: k.kislakova25@gmail.com