

СИБИРСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ  
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Siberian Electronic Mathematical Reports

<http://semr.math.nsc.ru>

---

---

Том 16, стр. 144–144 (2019)  
DOI 10.33048/semi.2019.16.xxx

УДК 517.5  
MSC 31B10

К ИССЛЕДОВАНИЮ ВЕСОВОЙ ОБОБЩЕННОЙ  
ГЕЛЬДЕРОВОСТИ ГИПЕРСИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛА НА  
МЕТРИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Ю.Е. ДРОБOTOV, Б.Г. ВАКУЛОВ

**АБСТРАКТ.** Получены весовые оценки типа Зигмунда для гиперсингулярного интеграла на почти однородном метрическом пространстве и, на их основе, теоремы о действии данного оператора в весовом пространстве обобщенной переменной гёльдеровости. В качестве веса рассматривается представитель класса степенных функций. Показано, что гиперсингулярный интеграл «ухудшает» характеристику обобщенного пространства Гёльдера на порядок гиперсингулярного интеграла. Условия представленных теорем сформулированы в терминах класса Зигмунда–Бари–Стечкина, а также специального аналога условия Дини.

**Keywords:** bounded operator, generalized Hölder spaces, hypersingular integral, integral equations, local modulus of continuity, modulus of submetry, stability, Zygmund-type estimates

## ВВЕДЕНИЕ

Как известно, рисово дробное интегродифференцирование функций многих вещественных переменных определяет производную через гиперсингулярный

---

DROBOTOV YU. E., VAKULOV B. G., ON THE WEIGHTED GENERALIZED HÖLDER PROPERTY OF A HYPERSINGULAR INTEGRAL ON A METRIC SPACE.

© 2022 Дроботов Ю. Е., Вакулов Б. Г.

Работа Дроботова Ю. Е. поддержана РФФИ и ТУБИТАК (грант 20-51-46003).

Работа Дроботова Ю. Е. выполнена в Северо-Кавказском центре математических исследований ВНЦ РАН при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-02-2023-914.

Поступила 1 января 2015 г., опубликована 31 декабря 2015 г.

интеграл [1, с. 483] (см. также [2, 3]), в том числе и на однородных пространствах, например – сфере [4]. Кроме того, всякий однородный дифференциальный оператор с постоянными коэффициентами может быть выражен гиперсингулярным интегралом с характеристикой специального вида [1, с. 530], что вызывает особый интерес к исследованию таких операторов в контексте задач математической физики.

Один из основных вопросов качественной теории интегральных операторов состоит в отыскании способа формализации их гладкости, содержательно характеризующего устойчивость соответствующих уравнений. На этом пути неизбежны обобщения классических функциональных пространств, и конечно пространств Гельдера типа, введение которых еще в теории эллиптических уравнений в частных производных мотивировано тем же вопросом. В качестве простой аналогии можно отметить, что потребность в описании континуальных свойств функций с помощью условия Гельдера возникает еще при исследовании классического уравнения Пуассона [6, с. 51], в то время как гиперсингулярный интеграл на  $n$ -мерном евклидовом пространстве  $\mathbb{R}^n$  реализует дробные степени оператора Лапласа.

В настоящей работе рассмотрены операторы гиперсингулярного интегрирования по множеству почти однородного метрического пространства. Исследуется отображение такими операторами функций, удовлетворяющих условию типа Гельдера с так называемым модулем субметрии – эквивалентом локального модуля непрерывности, отвечающим задаче исследования устойчивости интегральных уравнений первого рода.

**Обзор предыдущих исследований.** Раздел риссовых интегралов и производных дробного порядка получил развитие методами спектральной теории в таких известных работах С. Г. Самко, как [2–4]. Основным их результатом явилось описание пространства риссовых потенциалов на  $\mathbb{R}^n$  в терминах разностных сингулярных интегралов, особенность которых доминирует над размерностью пространства [5]. Результаты об обращении потенциалов Рисса такими, гиперсингулярными, интегралами доказывались на функциях из  $L^p$ -пространства, в том числе – в весовых терминах.

Подходы, основанные на исследовании символов интегральных операторов на сфере, позволили качественно обобщить теоретические результаты относительно операторов типа потенциала, в сущности породив самостоятельное направление анализа сферических сверток. В этом отношении стоит отметить работу [7], где рассматривались спектры некоторых наиболее часто встречающихся операторов сферической свертки, а также [8], пионерскую с точки зрения классификации таких операторов на основании асимптотического поведения на бесконечности их мультипликаторов Фурье–Лапласа. В ней же был поставлен вопрос о гладкости сферических сверток в терминах обобщенных пространств Гельдера, предпосылки к чему имеют довольно богатую историю; значимым же результатом в этом отношении является теорема об изоморфизме вида

$$A^\alpha (H^\varphi (\mathbb{S}^{n-1})) = H^{\varphi_\alpha} (\mathbb{S}^{n-1}),$$

где  $\mathbb{S}^{n-1}$  – единичная сфера в  $\mathbb{R}^n$ ,  $A^\alpha$  – оператор сферической свертки вида

$$A^\alpha f(x) := \int_{\mathbb{S}^{n-1}} k(x \cdot \sigma) f(\sigma) d\sigma, \quad x \in \mathbb{S}^{n-1},$$

спектр которого  $\{k_m\}_{m=0}^{\infty}$  в разложении по сферическим гармоникам (мультипликатор Фурье–Лапласа) имеет заданную асимптотику при  $m \rightarrow \infty$ , а  $\varphi(h)$  и  $\varphi_{\alpha}(h)$  есть мажоранты модуля непрерывности, характеризующие обобщенную гёльдеровость рассматриваемых функций.

Стоит напомнить, что гладкость как свойство непрерывной дифференцируемости функций может вводиться весьма разнообразными способами. Например, работы [9–11] определяли пространство гладких функций на сфере как частный случай пространств Бесова. В то же время, альтернативная точка зрения предполагала введение гладкости в терминах дифференцируемости по декартовым координатам [12]. Однако работы [13–15] показали возможность эквивалентной нормировки пространств Гёльдера, возникающих в этих двух различных подходах.

Свое развитие тематика обобщенно-гёльдеровских пространств получила в работах [16–18], предлагавших использовать в качестве мажоранты модуля непрерывности произвольный, не обязательно степенной, функциональный параметр. Гармонический анализ в таких пространствах пополнился результатами в области теории потенциала [19–22], в том числе и в последние годы: так, исследования [24–26], развивая результаты работы [8], представили условия ограниченности оператора типа потенциала Рисса со степенно-логарифмическим ядром на сфере, а также связанного с ним стереографической проекцией пространственного потенциала. В частных случаях оператор осуществляет изоморфизм обобщенных пространств Гёльдера, причем обратный оператор выражается композицией с гиперсингулярным интегралом. В работе [27] описаны классы однозначно разрешимых (в пространствах обобщенной гёльдеровости) интегральных уравнений первого рода, ядро оператора в которых имеет слабую особенность.

Интерес к операторам дробного интегродифференцирования переменного порядка [28–32] был естественно сопряжен с рассмотрением функциональных пространств, определяющие параметры которых также имеют функциональную природу. Отметим исследования [33–36], в которых были доказаны, в том числе, теоремы типа Соболева в случае пространств Лебега с переменным показателем; работы [37–43], в которых рассматривались пространства  $H^{\lambda(x)}$  переменной гёльдеровости и действие в них сферических, а затем и пространственных потенциалов постоянного и переменного (включая комплексные) порядков, и, наконец, [47, 48], описывающие действие операторов типа потенциала и гиперсингулярных интегралов, определенных на однородных пространствах, в  $H^{\lambda(x)}$  в безвесовом и случае специального веса.

Стоит заметить, что ослабление требований к множеству интегрирования за счет введения интегралов на множествах почти однородных квазиметрических пространств [47–49], является существенной проблемой. Отличие подхода, применяемого в этом случае, от известных в классической теории состоит в необходимости локализации аналитических свойств функций на таких пространствах на основании более общих геометрических соображений. Неприменимы более замечательные следствия евклидовой метризации пространства: например, тождество параллелограмма, которое, в случае сферы, приводит к следствию в область сферических сверток. Получение оценок типа Зигмунда затруднено отсутствием формулы Каталана, что потребовало создания аналогичного аппарата в работах [47, 48] (здесь он также используется в виде

Лемм 2 и 3). Наконец, оценки вблизи особых точек, например «весовой» точки  $a$ , требует применения специальных неравенств, выводимых, как правило, непосредственно из неравенства треугольника или, в случае квазиметрических пространств, его обобщения. Немаловажно, что при этом параметризация констант, с которыми ограничены соответствующие интегралы, усложняется и в качественном аспекте: они теперь становятся зависимы от имманентных характеристик самого множества интегрирования, что, конечно, играет свою роль в приложении полученных результатов для решения уравнений.

В настоящее время наибольший интерес представляют пространства обобщенной переменной гёльдеровости, введенные впервые в работе [44]. Исследования их с точки зрения риссова интегродифференцирования переменного порядка в [45, 46], ставили задачу на гиперсфере и гиперплоскости многомерного евклидова пространства; известны также результаты для этих пространств в нестандартном анализе голоморфных функций [52].

В завершение следует заметить, что генерализация известных функциональных пространств затрагивает отнюдь не только пространства гёльдеровского типа. Так, большой интерес представляет развитие анализа в пространствах Мори и их обобщениях [50, 51, 53–55], причем спектр подходов к постановке и решению соответствующих задач демонстрирует разнообразие даже в такой небольшой выборке референтных работ. Стоит отметить интенсивное развитие теории гранд-пространств, которая результатами ряда современных исследований [56–65] превращена в самодостаточную область анализа.

#### ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

**Основные определения.** Пусть  $(X, d, \mu)$  – произвольное метрическое пространство, где  $d(x, \sigma)$  означает расстояние, а  $\mu(\sigma)$  – меру для всяких  $x, \sigma \in X$ . Будем предполагать  $(X, d, \mu)$  таковым, что все его шары

$$B(x, h) := \{ \sigma \in X : d(x, \sigma) \leq h \}$$

удовлетворяют условию роста

$$(2) \quad \forall x \in X \quad \mu B(x, h) = O(h^\nu), \quad h \rightarrow 0,$$

где показатель  $\nu$  полагается действительным в рамках данной статьи.

**Определение 1.** Пусть  $\Omega$  – открытое ограниченное подмножество  $X$ ,

$$\alpha \in \mathbb{C} : \quad 0 < \operatorname{Re} \alpha < 1.$$

Гиперсингулярный интеграл определим следующим выражением:

$$(2) \quad D^\alpha f(x) := \int_{\Omega} \frac{f(\sigma) - f(x)}{d^{\nu+\alpha}(x, \sigma)} d\sigma, \quad x \in \Omega,$$

осуществляя интегрирование в смысле, аналогичном главному значению по Адамару:

$$\int_{\Omega} \varphi(x, \sigma) d\sigma = \lim_{h \rightarrow +0} \int_{\Omega \setminus B(x, h)} \varphi(x, \sigma) d\mu(\sigma).$$

Напомним, что отображение  $\varphi$  между метрическими пространствами  $M$  и  $N$  называется субметрией, если для каждой точки  $x \in (M, d)$  образ всякого замкнутого шара при отображении  $\varphi$  является замкнутым шаром того же радиуса с центром в точке  $\varphi(x)$  [66]. Оттолкнувшись от этого понятия, введем

следующую характеристику для случая, когда в качестве  $\varphi$  рассматривается числовая функция:

**Определение 2.** Пусть  $\Omega$  – произвольное ограниченное подмножество  $X$ . Будем называть модулем субметрии функции  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  функцию

$$(3) \quad \omega_{\Omega}(f, x, h) := \sup_{\sigma \in B(x, h)} |f(x) - f(\sigma)|, \quad x \in \Omega, \quad h > 0.$$

Таким образом, условие  $\omega_{\Omega}(f, x, h) = h$  гарантирует  $f$  как субметрию метрических пространств. Интерес, однако, представляют условия типа Гёльдера, более широкие и содержательные для приложения в качественной теории интегральных уравнений.

**Определение 3.** Будем называть пространством  $H^{\omega(\cdot)}(\Omega)$  обобщенной переменной гёльдеровости линейное пространство функций, удовлетворяющих неравенству

$$(4) \quad \omega_{\Omega}(f, x, h) \leq c \omega(x, h), \quad c > 0,$$

где функциональный параметр  $\omega(\cdot)$  называется характеристикой пространства  $H^{\omega(\cdot)}(\Omega)$ . Весовое  $H^{\omega(\cdot)}$ -пространство зададим выражением

$$(5) \quad H^{\omega(\cdot)}(\Omega, w) := \left\{ f : w f \in H^{\omega(\cdot)}(\Omega) \right\}.$$

При этом  $\omega_{\Omega}(\cdot, h)$ , как функция вещественного аргумента, эквивалентна колебанию  $\tilde{\omega}$  функции  $f$  в шаре  $B(x, h)$ . Действительно,

$$\omega_{\Omega}(f, x, h) \leq \sup_{\sigma_1, \sigma_2 \in B(x, h)} |f(\sigma_1) - f(\sigma_2)| =: \tilde{\omega}(f, B(x, h)),$$

и в то же время

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}(f, B(x, h)) &= \sup_{\sigma_1, \sigma_2 \in B(x, h)} |(f(\sigma_1) - f(x)) + (f(x) - f(\sigma_2))| \leq \\ &\leq 2 \sup_{\substack{\sigma \in \{\sigma_1, \sigma_2\} \\ \sigma_1, \sigma_2 \in B(x, h)}} |f(x) - f(\sigma)|, \end{aligned}$$

так что

$$(6) \quad 1 \leq \frac{\omega(f, B(x, h))}{\omega_{\Omega}(f, x, h)} \leq 2.$$

В свою очередь, колебание функции в шаре выражает значение модуля непрерывности как функции удвоенного радиуса, то есть

$$(7) \quad \tilde{\omega}(f, \Omega \cap B(x, h)) = \sup_{\substack{\sigma_1, \sigma_2 \in \Omega: \\ d(\sigma_1, \sigma_2) \leq 2h}} |f(\sigma_1) - f(\sigma_2)| =: \omega_f(2h),$$

что очевидно в силу неравенства треугольника. Учитывая это, предложим

**Определение 4.** Определим локальный модуль непрерывности функции  $f$  как следующую функцию на  $\Omega \times [0, l]$ :

$$M(f, x, h) := \tilde{\omega} \left( f, \Omega \cap B \left( x, \frac{h}{2} \right) \right), \quad 0 < l < \infty.$$

Модуль субметрии «несколько хуже» модуля непрерывности, ведь он, очевидно, не обязательно обладает свойством полуаддитивности. Однако функции  $M(\cdot, h)$  оно присуще как, фактически, сужению модуля непрерывности на замкнутый шар согласно выражению (7). Мотивированные этим наблюдением, выделим класс функций, аналитически близких к модулю непрерывности, привлекая

**Определение 5.** Будем называть  $\varphi(h)$ ,  $h \geq 0$ , функцией типа модуля непрерывности, если она эквивалентна обладающей следующими свойствами:

- $\varphi(h)$  непрерывна и  $\varphi(0) = 0$ ;
- $\varphi(h)$  является неубывающей полуаддитивной функцией, то есть

$$\varphi(h_1 + h_2) \leq \varphi(h_1) + \varphi(h_2).$$

В силу эквивалентности (6), определенный выражением (3) модуль субметрии  $\omega_\Omega(\cdot, h)$  доставляет пример функции типа модуля непрерывности:

$$(8) \quad \omega_\Omega(f, x, h) \sim M(f, x, h), \quad x \in \Omega.$$

В дальнейшем будем иногда применять термин *модули гладкости* как зонтичный для введенных выше конструкций.

**Постановка задачи.** Итак, условие (4) не только гарантирует непрерывность функции  $f$  в точке  $x \in \Omega$  в случае достаточно «хорошей» характеристики  $\omega(\cdot)$ , но и явно выражает взаимосвязь между  $h$ -окрестностью прообраза  $x \in \Omega$  и  $\omega(x, h)$ -окрестностью образа  $f(x) \in \mathbb{R}$ , допуская субметрию  $f$  как некоторый частный случай. Поставленная задача состоит в отыскании условий ограниченности гиперсингулярного интеграла (2) при отображении функций из  $H^{\omega(\cdot)}(\Omega, w)$  в случае, когда вес является степенной функцией вида

$$(9) \quad w(x) = d^r(x, a), \quad a, x \in \Omega, \quad 0 < r \leq 1.$$

Если  $D^\alpha$  выражает дифференциальный оператор (как в случае  $X = \mathbb{R}^n$ ), полученные далее теоремы о действии могут рассматриваться как достаточные условия весовой гладкости функции  $f$ .

Столь большое внимание свойству полуаддитивности обусловлено следующими свойствами локального модуля непрерывности, следующего из него напрямую:

**Лемма 1.** Пусть  $x \in \Omega$  – произвольно. При любом  $k > 0$  имеет место следующая оценка:

$$(10) \quad M(f, x, kh) \leq (k + 1) M(f, x, h), \quad h > 0.$$

Также справедлива оценка

$$(11) \quad \frac{M(f, x, h_1)}{h_1} \geq \frac{1}{2} \frac{M(f, x, h_2)}{h_2}, \quad 0 < h_1 \leq h_2.$$

*Доказательство.* Доказательство леммы основано на определении локального модуля непрерывности как сужения на локально центрированный шар модуля непрерывности и свойстве полуаддитивности последнего.  $\square$

Прежде, чем завершить раздел вспомогательных результатов, напомним

**Определение 6.** Будем говорить, что неотрицательная функция  $L(x, t)$ , определенная на  $\Omega \times [0, l]$ ,  $0 < l < \infty$ , почти возрастает по  $t$  равномерно по  $x$ , если найдется константа  $c_L \geq 1$  такая, что выполнено неравенство

$$L(x, t) \leq c_L L(x, \tau) \quad \text{для всех } 0 < t < \tau < l.$$

К числу результатов, используемых для оценки интегральных конструкций, принадлежат следующие леммы:

**Лемма 2.** Пусть  $L(x, t)$  – неотрицательная функция на  $\Omega \times [0, l]$ ,  $0 < l < \infty$ , почти возрастающая по  $t$  равномерно по  $x$  и удовлетворяющая неравенству

$$L(x, 2t) \leq c_0 L(x, t), \quad c_0 > 0.$$

Для всякой неотрицательной ограниченной функции  $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , справедлива оценка

$$\int_{B(x, h)} \frac{L(x, d(x, \sigma))}{[d(x, \sigma)]^{\varphi(x)}} d\sigma \leq c \int_0^h \frac{t^{\nu-1} L(x, t)}{t^{\varphi(x)}} dt, \quad 0 < c < \infty,$$

где  $x \in \Omega$ ,  $0 < h < l$ , а произвольные постоянные  $c_0$  и  $c$  не зависят от  $x$ .

**Лемма 3.** Пусть выполнены условия Леммы 2. Тогда

$$\int_{\Omega \setminus B(x, h)} \frac{L(x, d(x, \sigma))}{[d(x, \sigma)]^{\varphi(x)}} d\sigma \leq c \int_h^l \frac{t^{\nu-1} L(x, t)}{t^{\varphi(x)}} dt, \quad 0 < c < \infty,$$

где  $0 < h < l/k$ ,  $k > 1$ , постоянная  $c$  не зависит от  $x \in \Omega$ .

Доказательство лемм содержится в работе [48]. Их роль для анализа на произвольных метрических, а также квазиметрических пространствах аналогична роли формулы Каталана для сферических интегралов, позволяющей проводить оценку многомерных интегралов одномерными. В работах [47, 48] Леммы 2 и 3 были использованы для доказательства ограниченности гиперсингулярного интеграла (2) переменного порядка  $\alpha(\cdot)$  при отображении функций из  $H^{\omega(\cdot)}(\Omega)$ . Одна из этих теорем приведена далее с уточненной формулировкой, включающей условие Дини на характеристику пространства Гельдера.

#### ОЦЕНКА ТИПА ЗИГМУНДА

Прибавив и вычтя под знаком интеграла в (2) произведение  $w(\sigma)f(\sigma)$ , получаем следующее представление, справедливое для произвольного веса  $w$ :

$$(12) \quad w(x) \int_{\Omega} \frac{f(\sigma) - f(x)}{d^{\nu+\alpha}(x, \sigma)} d\sigma = \int_{\Omega} \frac{f_w(\sigma) - f_w(x)}{d^{\nu+\alpha}(x, \sigma)} d\sigma + \\ + \int_{\Omega} \frac{w(x) - w(\sigma)}{w(\sigma)} \frac{f_w(\sigma)}{d^{\nu+\alpha}(x, \sigma)} d\sigma,$$

где обозначено:

$$f_w(x) := w(x)f(x), \quad x \in \Omega.$$

Введем в рассмотрение интегральный оператор

$$(13) \quad \mathfrak{D}_{\Omega}^{\alpha} f_w(x) := \int_{\Omega} \frac{w(x) - w(\sigma)}{w(\sigma)} \frac{f_w(\sigma) - f_w(x)}{d^{\nu+\alpha}(x, \sigma)} d\sigma.$$

Если вес  $w$  является степенной функцией вида (9), то  $f_w(a) = 0$ , и из общего представления (12) имеем

$$(14) \quad w(x) D^\alpha f(x) = D^\alpha f_w(x) + \mathfrak{D}_\Omega^\alpha f_w(x), \quad x \in \Omega.$$

Объектом интереса настоящего исследования является второе слагаемое в правой части приведенного равенства, относительно которого справедлив следующий результат:

**Теорема 1.** *Имеет место следующая оценка типа Зигмунда:*

$$(15) \quad \begin{aligned} |\mathfrak{D}_\Omega^\alpha f_w(x) - \mathfrak{D}_\Omega^\alpha f_w(y)| \leq c \left\{ \sum_{z \in \{a, x, y\}} \int_0^h \frac{\omega_\Omega(f_w, z, t)}{t^{\operatorname{Re} \alpha + 1}} dt + \right. \\ \left. + h^r \sum_{z \in \{a, x\}} \int_h^l \frac{\omega_\Omega(f_w, z, t)}{t^{\operatorname{Re} \alpha + r + 1}} dt \right\}, \quad y \in B(x, h), \quad 0 < h < l, \quad 0 < c < \infty. \end{aligned}$$

*Доказательство.* Заметим, что в условии теоремы выполнено:

$$x, y \in \Omega : \quad d(x, y) \leq kh, \quad k > 1.$$

Имеет место следующая декомпозиция множества  $\Omega$ :

$$\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup (\Omega_3 \cap \Omega_4),$$

где введены подмножества <sup>1</sup>

$$(16) \quad \begin{aligned} \Omega_{1|2} &:= \{ \sigma \in \Omega : d(x|a, \sigma) \leq kh \}, \\ \Omega_{3|4} &:= \{ \sigma \in \Omega : d(x|a, \sigma) \geq kh \}. \end{aligned}$$

Тогда, в рамках (16), имеет место представление

$$\begin{aligned} \mathfrak{D}_\Omega^\alpha f_w(x) - \mathfrak{D}_\Omega^\alpha f_w(y) &= \mathfrak{D}_{\Omega_1 \cup \Omega_2}^\alpha f_w(x) - \mathfrak{D}_{\Omega_1 \cup \Omega_2}^\alpha f_w(y) + \\ &+ \int_{\Omega_3 \cap \Omega_4} \frac{(w(x) - w(y)) + (w(y) - w(\sigma))}{w(\sigma)} \frac{f_w(\sigma) - f_w(a)}{d^{\nu + \alpha}(x, \sigma)} d\sigma - \\ &- \int_{\Omega_3 \cap \Omega_4} \frac{w(y) - w(\sigma)}{w(\sigma)} \frac{f_w(\sigma) - f_w(a)}{d^{\nu + \alpha}(y, \sigma)} d\sigma, \end{aligned}$$

из которого следует оценка

$$(17) \quad \begin{aligned} |\mathfrak{D}_\Omega^\alpha f_w(x) - \mathfrak{D}_\Omega^\alpha f_w(y)| \leq &|\mathfrak{D}_{\Omega_1 \cup \Omega_2}^\alpha f_w(x)| + |\mathfrak{D}_{\Omega_1 \cup \Omega_2}^\alpha f_w(y)| + \\ &+ |w(x) - w(y)| \cdot |I| + |J|, \end{aligned}$$

<sup>1</sup>Здесь и далее запись вида « $a|b$ » употребляется для обозначения выбора из двух вариантов.

где явно выделены следующие интегралы:

$$I := \int_{\Omega_3 \cap \Omega_4} \frac{f_w(\sigma) - f_w(a)}{w(\sigma) d^{\nu+\alpha}(x, \sigma)} d\sigma,$$

$$J := \int_{\Omega_3 \cap \Omega_4} \frac{w(y) - w(\sigma)}{w(\sigma)} \left( \frac{1}{d^{\nu+\alpha}(x, \sigma)} - \frac{1}{d^{\nu+\alpha}(y, \sigma)} \right) f_w(\sigma) d\sigma.$$

Будем последовательно оценивать слагаемые из правой части (17), конструируя мажоранты необходимого вида.

**Оценка первого слагаемого.** Прежде всего отметим неравенство

$$(18) \quad |w(x) - w(\sigma)| = |d^r(x, a) - d^r(a, \sigma)| \leq d^r(x, \sigma),$$

следующее из обратного неравенства треугольника, а также числового результата

$$|r_1^\gamma - r_2^\gamma| \leq |r_1 - r_2|^\gamma, \quad r_1, r_2 \geq 0, \quad 0 < \gamma \leq 1,$$

известного, например, из работы [17, с. 27].

Множество  $\Omega_1 \cup \Omega_2$  предполагает четыре взаимоисключающих варианта расположения точек  $x$  и  $a$ :

$$(19) \quad \Lambda_{1|2} = \Lambda_{1|2}(x) := \{ \sigma \in \Omega : d(a|x, \sigma) \leq d(x|a, \sigma) \leq kh \},$$

$$\Theta_{1|2} = \Theta_{1|2}(x) := \{ \sigma \in \Omega : d(a|x, \sigma) \leq kh \leq d(x|a, \sigma) \},$$

где принципиально важным является соотношение  $d(a, \sigma)$  и  $d(x, \sigma)$ . Исходя из двух вариантов последнего, а именно:

$$\Lambda_1(x) \cup \Theta_1(x) \quad \text{и} \quad \Lambda_2(x) \cup \Theta_2(x),$$

составим мажоранту как сумму соответствующих интегралов.

Важную роль играет оценка, очевидно следующая из эквивалентности (8):

$$(20) \quad |f_w(\sigma) - f_w(a)| \leq \sup_{\sigma_1, \sigma_2 \in B(a, d(a, \sigma))} |f_w(\sigma_1) - f_w(\sigma_2)| =$$

$$= M(f_w, a, d(a, \sigma)) \leq 2\omega_\Omega(f, a, d(a, \sigma)),$$

Имея в виду оценку (20), применим Лемму 2 к первому интегральному слагаемому мажоранты:

$$(21) \quad |\mathfrak{D}_{\Lambda_1 \cup \Theta_1}^\alpha f_w(x)| \leq \int_{\Lambda_1 \cup \Theta_1} \frac{|f_w(\sigma) - f_w(a)|}{d^r(a, \sigma) d^{\nu-r+\text{Re } \alpha}(x, \sigma)} d\sigma \leq$$

$$\leq c_1 \int_{B(a, kh)} \frac{M(f_w, a, d(a, \sigma))}{d^{\nu+\text{Re } \alpha}(a, \sigma)} d\sigma \leq c_2 \int_0^h \frac{\omega_\Omega(f_w, a, t)}{t^{\text{Re } \alpha+1}} dt,$$

где  $0 < c_1, c_2 < \infty$  – некоторые постоянные, причем  $c_2 = 2c_1(k+1)k^{-\text{Re } \alpha}$ , что очевидно в результате замены переменной вида  $t \rightarrow kt$  и применения свойства (10) локального модуля непрерывности.

Для интеграла по  $\Lambda_2(x) \cup \Theta_2(x)$  рассуждения во многом аналогичны. Выше модуль субметрии вычислялся в точке  $a$ , поскольку  $d(a, \sigma)$  полагалось минимальным. Теперь же оценим числитель подынтегрального выражения, ориентируясь на гладкостные свойства функции  $f_w$  в окрестности точки  $x$ :

$$(22) \quad \begin{aligned} |f_w(\sigma) - f_w(a)| &\leq |f_w(\sigma) - f_w(x)| + |f_w(x) - f_w(a)| \leq \\ &\leq 4M(f_w, x, d(a, \sigma)), \quad d(x, \sigma) \leq d(a, \sigma), \end{aligned}$$

что можно показать, используя для оценки первого слагаемого модуля факт вида (20) и неубывание локального модуля непрерывности:

$$|f_w(\sigma) - f_w(x)| \leq M(f_w, x, d(x, \sigma)) \leq M(f_w, x, d(a, \sigma)), \quad d(x, \sigma) \leq d(a, \sigma),$$

а для оценки второго – заметив, что из неравенства

$$(23) \quad d(x, a) \leq d(x, \sigma) + d(a, \sigma) \leq 2d(a, \sigma),$$

и свойства (10) локального модуля непрерывности следует оценка

$$(24) \quad |f_w(x) - f_w(a)| \leq M(f_w, x, d(x, a)) \leq 3M(f_w, x, d(a, \sigma)).$$

Отметим далее, что в силу свойства (11) модуля непрерывности имеет место:

$$(25) \quad \frac{M(f_w, x, d(a, \sigma))}{d(a, \sigma)} \leq 2 \frac{M(f_w, x, d(x, \sigma))}{d(x, \sigma)}, \quad d(x, \sigma) \leq d(a, \sigma),$$

а значит, вновь применив Лемму 2, имеем:

$$\begin{aligned} |\mathfrak{D}_{\Lambda_2 \cup \Theta_2}^\alpha f_w(x)| &\leq 4 \int_{\Lambda_2 \cup \Theta_2} \frac{M(f_w, x, d(a, \sigma))}{d^r(a, \sigma) d^{\nu-r+\operatorname{Re} \alpha}(x, \sigma)} d\sigma \leq \\ &\leq 8 \int_{B(x, kh)} \frac{M(f_w, x, d(x, \sigma))}{d^{\nu+\operatorname{Re} \alpha}(x, \sigma)} d\sigma \leq c \int_0^h \frac{\omega_\Omega(f_w, a, t)}{t^{\operatorname{Re} \alpha+1}} dt. \end{aligned}$$

Следовательно, мажоранта первого слагаемого из генерального представления (17) имеет вид:

$$(26) \quad |\mathfrak{D}_{\Omega_1 \cup \Omega_2}^\alpha f_w(x)| \leq c \left\{ \int_0^h \frac{\omega_\Omega(f_w, x, t)}{t^{\operatorname{Re} \alpha+1}} dt + \int_0^h \frac{\omega_\Omega(f_w, a, t)}{t^{\operatorname{Re} \alpha+1}} dt \right\},$$

где  $0 < c < \infty$  – некоторая постоянная, вид которой продиктован исключительно Леммой 2.

**Оценка второго слагаемого.** Поскольку  $d(x, y) \leq kh$ , в силу неравенства треугольника имеет место:

$$d(y, \sigma) \leq d(x, y) + d(x, \sigma) \leq (k+1)h, \quad \forall \sigma \in \Omega_1,$$

а значит

$$\Omega_1 \subseteq \{ \sigma \in \Omega : d(y, \sigma) \leq (k+1)h \} =: G, \quad G \cup \Omega_2 = \bigcup_{i=1}^2 \Lambda_i(y) \cup \Theta_i(y),$$

где  $\Lambda_i(y)$  и  $\Theta_i(y)$  заданы выражением (19). Повторив рассуждения из предыдущего пункта, приходим к искомой оценке вида (26).

**Оценка третьего слагаемого.** Множество  $\Omega_3 \cap \Omega_4$  оставляет два равно-возможных варианта расположения точек  $x$  и  $a$  относительно  $y$ :

$$(27) \quad H_{1|2} := \{ \sigma \in \Omega : kh \leq d(a|x, \sigma) \leq d(x|a, \sigma) \},$$

$$\Omega_3 \cap \Omega_4 = H_1 \cup H_2.$$

В таком случае для интеграла  $I$  имеет место

$$|I| \leq \int_{H_1 \cup H_2} \frac{|f_w(\sigma) - f_w(a)|}{d^r(a, \sigma) d^{\nu + \operatorname{Re} \alpha}(x, \sigma)} d\sigma = I_1 + I_2,$$

где правая часть представлена суммой интегралов с тем же подынтегральным выражением, но взятых по  $H_1$  и  $H_2$  соответственно.

Первый из них оценивается в тех же соображениях, что и  $\mathfrak{D}_{\Lambda_1 \cup \Theta_1}^\alpha f_w(x)$  в (21). Поскольку  $d(a, \sigma)$  минимально на  $H_1$ , имеет место:

$$|I_1| \leq \int_{\Omega \setminus B(a, kh)} \frac{M(f_w, a, d(a, \sigma))}{d^{r+\nu+\operatorname{Re} \alpha}(a, \sigma)} d\sigma \leq c \int_h^l \frac{\omega_\Omega(f_w, a, t)}{t^{r+\operatorname{Re} \alpha+1}} dt, \quad 0 < c < \infty.$$

Аналогично, оценка интеграла  $I_2$  повторяет ход рассуждений в основе оценки  $\mathfrak{D}_{\Lambda_2 \cup \Theta_2}^\alpha f_w(x)$ . Воспользуемся (22) и затем (25):

$$|I_2| \leq 4 \int_{H_2} \frac{M(f_w, x, d(a, \sigma))}{d^r(a, \sigma) d^{\nu + \operatorname{Re} \alpha}(x, \sigma)} d\sigma \leq 8 \int_{\Omega \setminus B(x, kh)} \frac{M(f_w, x, d(x, \sigma))}{d^{\nu+r+\operatorname{Re} \alpha}(x, \sigma)} d\sigma,$$

где осталось лишь применить Лемму 3 и эквивалентность (8) модулей гладкости.

Наконец, поскольку

$$|w(x) - w(y)| = |d^r(x, a) - d^r(y, a)| \leq d^r(x, y) \leq k^r h^r,$$

в силу неравенства треугольника и (18) получаем для третьего слагаемого:

$$|w(x) - w(y)| \cdot |I| \leq c h^r \left\{ \int_h^l \frac{\omega_\Omega(f_w, x, t)}{t^{r+\operatorname{Re} \alpha+1}} dt + \int_h^l \frac{\omega_\Omega(f_w, a, t)}{t^{r+\operatorname{Re} \alpha+1}} dt \right\}.$$

Отметим, что значение константы  $c$  здесь может быть восстановлено до произвольной постоянной из оценки Леммы 3 и величины  $h$ .

**Оценка четвертого слагаемого.** Прежде всего, запишем:

$$(28) \quad |J| \leq \int_{\Omega_3 \cap \Omega_4} \frac{|d^r(a, y) - d^r(a, \sigma)|}{d^r(a, \sigma)} |d^{-\nu - \operatorname{Re} \alpha}(x, \sigma) - d^{-\nu - \operatorname{Re} \alpha}(y, \sigma)| \cdot |f_w(\sigma) - f_w(a)| d\sigma.$$

Нам понадобится следующее неравенство с  $\gamma \in \mathbb{C}$ , доказательство которого основано на применении обобщенной теоремы о среднем значении [67, с. 113]:

$$(29) \quad |d^{-\gamma}(x_1, x_2) - d^{-\gamma}(x_2, x_3)| \leq 2^{\operatorname{Re} \gamma + 1} |\gamma| \frac{d(x_1, x_3)}{[d(x_1, x_2)]^{\operatorname{Re} \gamma + 1}},$$

$$x_k \in X, \quad k = \overline{1, 3}.$$

Применив его к первому модулю под интегралом в правой части (28), обозначаемому в дальнейшем буквой  $\kappa$ , получаем:

$$\kappa := |d^r(a, \sigma) - d^r(a, y)| \leq c_0 \frac{d(y, \sigma)}{d^{1-r}(a, \sigma)}, \quad c_0 = 2^{1-r} r.$$

Исследуя второй модуль, обозначим для краткости:

$$d_1 = d(x, \sigma), \quad d_2 = d(y, \sigma), \quad \gamma = \alpha + \nu.$$

Прибавив и вычтя под модулем величину  $d_1^{-\operatorname{Re} \gamma} d_2^{-i \operatorname{Im} \gamma}$ , имеем:

$$\begin{aligned} |d_1^{-\gamma} - d_2^{-\gamma}| &\leq \left| d_1^{-\operatorname{Re} \gamma} \right| \left| d_1^{-i \operatorname{Im} \gamma} - d_2^{-i \operatorname{Im} \gamma} \right| + \\ &\quad + \left| d_2^{-i \operatorname{Im} \gamma} \right| \left| d_1^{-\operatorname{Re} \gamma} - d_2^{-\operatorname{Re} \gamma} \right| =: \kappa_1 + \kappa_2. \end{aligned}$$

Модуль разности в слагаемом  $\kappa_1$  оценим, вновь используя (29):

$$\left| d_1^{-i \operatorname{Im} \gamma} - d_2^{-i \operatorname{Im} \gamma} \right| = \left| d^{-i \operatorname{Im} \gamma}(x, \sigma) - d^{-i \operatorname{Im} \gamma}(y, \sigma) \right| \leq \frac{d(x, y)}{d(x, \sigma)},$$

так что мажорантой  $\kappa_1$  является отношение

$$\kappa_1 \leq \frac{d(x, y)}{d^{\operatorname{Re} \alpha + \nu + 1}(x, \sigma)}.$$

Примем во внимание конструкцию множества интегрирования, а именно:

$$(30) \quad d(x, y) \leq k h \leq d(x, \sigma), \quad \sigma \in \Omega_3 \cap \Omega_4,$$

в силу чего обеспечено:

$$\frac{d(y, \sigma)}{d(x, \sigma)} \leq \frac{d(x, y) + d(x, \sigma)}{d(x, \sigma)} \leq 1 + \frac{d(x, y)}{d(x, \sigma)} \leq 2.$$

Таким образом, имеет место оценка:

$$(31) \quad \frac{\kappa \kappa_1}{d^r(a, \sigma)} \leq c_0 \frac{d(y, \sigma)}{d(x, \sigma)} \frac{d(x, y)}{d(a, \sigma) d^{\operatorname{Re} \alpha + \nu}(x, \sigma)} \leq \frac{c h}{d(a, \sigma) d^{\operatorname{Re} \alpha + \nu}(x, \sigma)},$$

где, строго говоря,  $c = 2 c_0 k$ .

Рассмотрим оценку композиции со слагаемым  $\kappa_2$ . Напомним еще одно неравенство, приводившееся, например, в книге С. Л. Соболева [68, с. 251]:

$$(32) \quad \left| \frac{1}{d_1^\gamma} - \frac{1}{d_2^\gamma} \right| \leq c \frac{|d_1 - d_2| (d_1 + d_2)^{\gamma-1}}{(d_1 d_2)^\gamma}, \quad d_1, d_2 > 0, \quad \gamma \in \mathbb{R}, \quad c > 0.$$

Воспользуемся им для оценки  $\kappa_2$ :

$$\left| d_1^{-\operatorname{Re} \gamma} - d_2^{-\operatorname{Re} \gamma} \right| \leq c_1 d(x, y) \frac{(d(x, \sigma) + d(y, \sigma))^{\nu + \operatorname{Re} \alpha - 1}}{(d(x, \sigma) d(y, \sigma))^{\nu + \operatorname{Re} \alpha}}, \quad c_1 > 0,$$

где нашло применение также неравенство треугольника. Вновь отметим (30), которое влечет оценку

$$\frac{d(x, \sigma)}{d(y, \sigma)} \leq \frac{d(x, y) + d(y, \sigma)}{d(y, \sigma)} \leq 1 + \frac{k h}{d(y, \sigma)}.$$

Поскольку также

$$d(y, \sigma) \geq d(x, \sigma) - d(x, y) \geq (k - 1) h, \quad \sigma \in \Omega_3 \cap \Omega_4,$$

имеет место следующее неравенство с уточненной константой в правой части:

$$\frac{d(x, \sigma)}{d(y, \sigma)} \leq 1 + \frac{k}{k-1}, \quad k > 1.$$

Следовательно, вынося в числителе  $d(y, \sigma)$ , имеем:

$$(33) \quad \frac{\kappa \kappa_2}{d^r(a, \sigma)} \leq \frac{c h}{d(a, \sigma) d^{\nu+\operatorname{Re} \alpha}(x, \sigma)}, \quad c = c_0 c_1 \frac{k(2k-1)}{k-1}.$$

Наконец, оценив правую часть неравенства (28) суммой интегралов с  $\kappa_1$  и  $\kappa_2$  в составе соответствующих подынтегральных выражений, имеем на основании оценок (31) и (33):

$$|J| \leq c h \sum_{k=1}^2 \int_{H_k} \frac{|f_w(\sigma) - f_w(a)|}{d(a, \sigma) d^{\nu+\operatorname{Re} \alpha}(x, \sigma)} d\sigma =: c h (J_1 + J_2),$$

где множества  $H_k$ ,  $k = 1, 2$ , определены выше выражением (27), а в качестве  $c$  может быть выбрана максимальная из констант в (31) и (33).

На  $H_1$  выполняется  $d(a, \sigma) \leq d(x, \sigma)$ , так что для  $J_1$  имеем в силу (20) и Леммы 3:

$$J_1 \leq 2 \int_{\Omega \setminus B(a, kh)} \frac{\omega_{\Omega}(f_w, a, d(a, \sigma))}{d^{\nu+\operatorname{Re} \alpha+1}(a, \sigma)} d\sigma \leq c \int_h^l \frac{\omega_{\Omega}(f_w, a, t)}{t^{\operatorname{Re} \alpha+2}} dt.$$

Для  $H_2$  воспользуемся (22), (25), свойством эквивалентности модулей гладкости и Леммой 3:

$$J_2 \leq 8 \int_{\Omega \setminus B(x, kh)} \frac{M(f_w, x, d(x, \sigma))}{d^{\nu+\operatorname{Re} \alpha+1}(x, \sigma)} d\sigma \leq c \int_h^l \frac{\omega_{\Omega}(f_w, x, d(x, \sigma))}{d^{\operatorname{Re} \alpha+2}(x, \sigma)} d\sigma.$$

В заключение отметим, что

$$\frac{h}{t^{\operatorname{Re} \alpha+2}} \leq \frac{h^r t^{1-r}}{t^{\operatorname{Re} \alpha+2}} = \frac{h^r}{t^{r+\operatorname{Re} \alpha+1}}, \quad h \leq t, \quad r \leq 1.$$

Таким образом, имеем для последнего слагаемого из представления (17)

$$|J| \leq c h^r \left\{ \int_h^l \frac{\omega_{\Omega}(f_w, x, t)}{t^{r+\operatorname{Re} \alpha+1}} dt + \int_h^l \frac{\omega_{\Omega}(f_w, a, t)}{t^{r+\operatorname{Re} \alpha+1}} dt \right\}.$$

**Завершающие выводы.** Объединив полученные выше оценки, получаем утверждение доказываемой теоремы.  $\square$

#### ТЕОРЕМА О ДЕЙСТВИИ

Чтобы сформулировать условия на характеристику  $\omega(x, h)$ , обеспечивающие ограниченность оператора  $D^{\alpha}$  при отображении элемента  $H^{\omega(\cdot)}(\Omega)$ , сперва рассмотрим следующий класс функций:

**Определение 7.** Пусть  $T_l := \Omega \times [0, l]$ ,  $l > 0$ . Отнесем всякую функцию  $\omega : T_l \rightarrow [0, \infty)$  к классу  $W(T_l)$ , если обеспечено следующее:

- $\forall x \in \Omega$  функция  $\omega(x, t)$  непрерывна по  $t \in [0, l]$ ;
- $\inf_{x \in \Omega} \omega(x, t) > 0$  при  $t > 0$  и  $\forall x \in \Omega \quad \lim_{t \rightarrow +0} \omega(x, t) = 0$ ;

- $\omega(x, t)$  почти возрастает по  $t$  для всех  $x \in \Omega$ .

Спецификацией класса  $W$  является класс Зигмунда–Бари–Стечкина, достаточно широкий для построения теории обобщенных пространств Гельдера:

**Определение 8.** Функция  $\omega \in W(T_l)$  принадлежит классу Зигмунда–Бари–Стечкина  $\Phi_\beta^\delta = \Phi_\beta^\delta(T_l)$ , где  $0 \leq \delta < \beta$ ,  $x \in \Omega$ , если одновременно выполнены следующие условия:

$$(34) \quad \int_0^h \left(\frac{h}{t}\right)^\delta \frac{\omega(x, t)}{t} dt \leq c\omega(x, h), \quad \int_h^l \left(\frac{h}{t}\right)^\beta \frac{\omega(x, t)}{t} dt \leq c\omega(x, h),$$

где  $0 < h < \frac{l}{2}$ , и постоянная  $c > 0$  не зависит ни от  $h$ , ни от  $x$ .

Естественной нормой в пространстве  $H^{\omega(\cdot)}(\Omega)$  является

$$(35) \quad \|f\|_{H^{\omega(\cdot)}(\Omega)} = \|f\|_{C(\Omega)} + \sup_{\substack{x \in \Omega, \\ h > 0}} \frac{\omega_\Omega(f, x, h)}{\omega(x, h)},$$

где символом  $C(\Omega)$  обозначено пространство равномерно непрерывных на  $\Omega$  функций. Последнее, в силу эквивалентности модулей гладкости, можно определить условием вида

$$C(\Omega) := \left\{ f : \lim_{h \rightarrow +0} \omega_\Omega(f, x, h) = 0, \quad \forall x \in \Omega \right\},$$

следовательно, условие (4) обобщенной гельдеровости с характеристикой из класса  $W$  влечет равномерную непрерывность функции  $f$ .

**Теорема 2.** Пусть гельдеровская характеристика

$$(36) \quad \omega \in \Phi_{1+\text{Re } \alpha}^{\text{Re } \alpha}, \quad 0 < \text{Re } \alpha < 1,$$

а также удовлетворяет условию типа Дини:

$$(37) \quad c_1 \omega(y, d(x, y)) \leq \omega(x, d(x, y)) \leq c_2 \omega(y, d(x, y)), \\ x, y \in \Omega, \quad 0 < c_1, c_2 < \infty.$$

Тогда оператор  $D^\alpha$  ограничен из  $H^{\omega(\cdot)}(\Omega)$  в  $H^{\omega^{-\alpha(\cdot)}}(\Omega)$  с характеристикой

$$(38) \quad \omega_{-\alpha}(x, h) := h^{-\text{Re } \alpha} \omega(x, h), \quad 0 < h < l < \infty.$$

Доказательство Теоремы 2 приводилось в работе [48]. Наконец, имеет место результирующая

**Теорема 3.** Пусть характеристика  $\omega(x, h)$  удовлетворяет условиям (36) и (37), а также, для всякого  $h > 0$ , условию

$$(39) \quad \sup_{x \in \Omega} \frac{\omega(a, h)}{\omega(x, h)} \leq c_\omega, \quad 0 < c_\omega < \infty.$$

Тогда оператор  $D^\alpha$  ограничен из  $H^{\omega(\cdot)}(\Omega, w)$  в  $H^{\omega^{-\alpha(\cdot)}}(\Omega, w)$  с характеристикой (38) и степенным весом

$$w(x) = d^r(x, a), \quad 0 < r \leq 1.$$

*Доказательство.* Воспользуемся аддитивным представлением (14). Ограниченность первого слагаемого в правой его части утверждается Теоремой 2. Ограниченность же оператора  $\mathfrak{D}_\Omega^\alpha$  на функции  $f_w$  следует из оценки типа Зигмунда, постулированной Теоремой 1.

Действительно, продолжив неравенство (15), имеем:

$$\begin{aligned} \frac{|\mathfrak{D}_\Omega^\alpha f_w(x) - \mathfrak{D}_\Omega^\alpha f_w(y)|}{h^{-\operatorname{Re} \alpha} \omega(x, h)} \leq \frac{c}{\omega(x, h)} \left\{ \sum_{z \in \{a, x, y\}} \int_0^h \left(\frac{h}{t}\right)^{\operatorname{Re} \alpha} \frac{\omega_\Omega(w f, z, t)}{t} dt + \right. \\ \left. + \sum_{z \in \{a, x\}} \int_h^l \left(\frac{h}{t}\right)^{r+\operatorname{Re} \alpha} \frac{\omega_\Omega(w f, z, t)}{t} dt \right\}, \end{aligned}$$

где  $0 < c < \infty$  – некоторая постоянная. Имея в виду условие (39) теоремы, заметим, что

$$\frac{c}{\omega(x, h)} \leq \frac{c c_\omega}{\omega(a, h)}, \quad h > 0.$$

Наличие данного функционального сомножителя приводит к необходимой оценке при  $z = a$  немедленно, в то время как для оценки слагаемых с  $z = x$  достаточно воспользоваться определением класса Зигмунда–Бари–Стечкина. Слагаемое же с  $z = y$  требует применения неравенства (37).

Наконец, переходя в полученном неравенстве к супремуму, имеем ограниченность оператора  $D^\alpha$  в терминах нормы (35).  $\square$

Заметим, что в случае всюду положительной характеристики  $\omega(x, h)$  условие (39) может быть заменено условием эквивалентности (см. определение на с. 52 монографии [17])

$$\omega(x, h) \sim \omega(a, h), \quad h > 0,$$

как функций вещественной переменной  $h$  или более конкретным требованием минимума функции  $\omega(x, h)$  в точке  $x = a$  для всякого  $h > 0$  (при этом, очевидно,  $c_\omega = 1$ ).

#### REFERENCES

- [1] S. G. Samko, A. A. Marichev, O. I. Kilbas, *Fractional integrals and derivatives: theory and applications*, Gordon and Breach Science Publishers, Philadelphia, PA, 1993.
- [2] S. G. Samko, *On spaces of Riesz potentials*, *Izv. Math.*, **10**:5 (1976), 1089–1117.
- [3] S. G. Samko, *Generalized Riesz potentials and hypersingular integrals, their symbols and inversion*, *Dokl. Akad. Nauk SSSR*, **232**:3 (1977), 528–531.
- [4] S. G. Samko, *Spherical potentials, spherical Riesz differentiation, and their applications*, *Russian Math. (Iz. VUZ)*, **21**:2 (1977), 106–110.
- [5] S. G. Samko, *Generalized Riesz potentials and hypersingular integrals with homogeneous characteristics; their symbols and inversion*, *Proc. Steklov Inst. Math.*, **156** (1980), 173–243.
- [6] D. Gilbarg, N. S. Trudinger, *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*, Springer-Verlag (2001)
- [7] S. G. Samko, *Singular integrals over a sphere and the construction of the characteristic from the symbol*, *Russian Math. (Iz. VUZ)*, **27**:4 (1983), 35–52.

- [8] B. G. Vakulov, *An operator of potential type on a sphere in generalized Hölder classes*, Russian Math. (Iz. VUZ), **30**:11 (1986), 90–94.
- [9] A. S. Dzhafarov, *Konstruktivnoe opisanie obobshchennykh klassov Besova na mnogomernoj sfere*, DAN SSSR, **285**: 3 (1985), 542–546.
- [10] A. D. Gadzhiev, H. P. Rustamov, *Jekvivalentnaja normirovka v prostranstvakh Besova na sfere i svojstva simvola mnogomernogo singuljarnogo integrala*, Izv. vuzov, Matemat., **9** (1984), 69–71.
- [11] I. V. Petrova, *Teorema Dzheksona i prostranstva Besova na sfere*, DAN SSSR, Vol. 276, 3 (1984), 544–549.
- [12] S. M. Nikolsky, Lizorkin P. I. *Priblizhenie sfericheskimi polinomami*, Tr. MIAN SSSR, Moscow, 166, 1984, 186–200.
- [13] B. G. Vakulov, S. G. Samko, *Equivalent normings in spaces of functions of fractional smoothness on the sphere, of type  $C^\lambda(\mathbb{S}_{n-1})$ ,  $H^\lambda(\mathbb{S}_{n-1})$* , Russian Math. (Iz. VUZ), **31**: 12 (1987), 90–95.
- [14] S. G. Samko, B. G. Vakulov, *On equivalent norms in fractional order function spaces of continuous functions on the unit sphere*, Fract. Calc. Appl. Anal., **3**: 4 (2000), 401–433.
- [15] B. G. Vakulov, *Ob ekvivalentnykh normirovках v prostranstvakh funkcij kompleksnoj gladkosti na sfere*, Proceedings of the Institute of Mathematics, **9** (2001), 41–44.
- [16] A. S. Dzhafarov, *Nailuchshee priblizhenie konechnymi sfericheskimi summami i nekotorye differencial'nye svojstva garmonicheskikh v share funkcij*, Teoremy vlozheniya i ih prilozheniya. Trudy simpoziuma po teoreмам vlozheniya. Baku, 1966 god, Nauka, 1970, 75–81.
- [17] A. I. Gusejnov, H. Sh. Muhtarov, *Vvedenie v teoriyu nelinejnykh singulyarnykh integral'nykh uravnenij*, Nauka, Moscow, 1980.
- [18] H. P. Rustamov, *O tochnosti gladkostnykh svojstv simvola mnogomernogo singuljarnogo operatora s nepreryvnoj harakteristikoj*, Deponirovanie v VINITI, Baku, 1981, №5014-81 DEP.
- [19] L. D. Shankishvili *Operatory tipa sfericheskogo potenciala kompleksnogo porjadka v obobshchjonnykh prostranstvakh G'jol'dera*, Deponirovanie v VINITI 23.03.98, №860-B98.
- [20] B. G. Vakulov, *Sfericheskie operatory tipa potenciala v obobshchennykh prostranstvakh Gel'dera s vesom na sfere*, Izvestiya vysshih uchebnykh zavedenij. Severo-Kavkazskij region. Seriya: estestvennye nauki, **4** (1999), 5–10.
- [21] B. G. Vakulov, N. K. Karapetians, L. D. Shankisdvili, *Spherical hypersingular operators of imaginary order and their multipliers*, Fractional Calculus and Applied Analysis, **4** : 1 (2001), 101.
- [22] B. G. Vakulov, N. K. Karapetjanc, L. D. Shankishvili, *Spherical convolution operators with a power-logarithmic kernel in generalized Hölder spaces*, Russian Math. (Iz. VUZ), **47**:2 (2003), 1–12.
- [23] B. G. Vakulov, G. S. Kostetskaya, Yu. E. Drobotov, *Riesz potentials in generalized Hölder spaces*, Fractal Approaches for Modeling Financial Assets and Predicting Crises, IGI Global, 249–273.
- [24] B. G. Vakulov, Yu. E. Drobotov, *Riesz potential with logarithmic kernel in generalized Hölder spaces*, Recent Applications of Financial Risk Modelling and Portfolio Management, IGI Global, 275–296.

- [25] B. G. Vakulov, Yu. E. Drobotov, *The Riesz potential type operator with a power-logarithmic kernel in the generalized Hölder spaces on a sphere*, Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications, Springer International Publishing, Cham, 147–159.
- [26] Yu. E. Drobotov, B. G. Vakulov, *Smoothness properties of a Riesz potential type operator with logarithmic characteristic*, University News. North-Caucasus Region. Natural Sciences Series, **1** (2022), 4–11.
- [27] Yu. E. Drobotov, B. G. Vakulov, *The Riesz potential type operator with a power-logarithmic kernel in the generalized Hölder spaces on a sphere*, Springer Proceedings in Materials, **20** (2023), 120–132.
- [28] S. G. Samko, B. Ross, *Integration and differentiation to a variable fractional order*, Integral Transform. Spec. Funct, **1** (1993), 277–300.
- [29] S. G. Samko, *Fractional integration and differentiation of variable order*, Anal. Math., **21** (1995), 213–236.
- [30] B. G. Vakulov, E. S. Kochurov, *Operatory drobnogo integrirvaniya i differencirovaniya peremennogo porjadka v prostranstvah Gjol'dera  $H^{\omega(x,t)}$* , Vladikavkazskij matematicheskij zhurnal, **12**: 4 (2010), 3–11.
- [31] B. G. Vakulov, E. S. Kochurov, *Ocenki tipa Zigmunda dlja operatorov drobnogo integrirvaniya i differencirovaniya peremennogo porjadka*, Izv. vuzov. Sev. Kavk. region. Estestv. nauki. Specvypusk (2011), 15–17.
- [32] B. G. Vakulov, E. S. Kochurov, N. G. Samko, *Zygmund-type estimates for fractional integration and differentiation operators of variable order*, Russian Mathematics, **55**: 6 (2011), 20–28.
- [33] S. G. Samko, *Differentiation and integration of variable order and the spaces  $L^{p(x)}$* , Contemporary Mathematics, **212** (1998), 203–219.
- [34] B. G. Vakulov, S. G. Samko, *A weighted Sobolev theorem for spatial and spherical potentials in Lebesgue spaces with variable exponents*, Doklady Mathematics, **72** : 1 (2005), 487–490.
- [35] S. Samko, E. Shargorodsky, B. Vakulov, *Weighted Sobolev theorem with variable exponent for spatial and spherical potential operators, II*, Journal of Mathematical Analysis and Applicationsthis, **325**: 1 (2007), 745–751.
- [36] N. G. Samko, S. G. Samko, B. G. Vakulov, *Weighted Sobolev theorem in Lebesgue spaces with variable exponent*, Journal of Mathematical Analysis and Applicationsthis, **335**: 1 (2007), 560–583.
- [37] A. I. Ginsburg, N. K. Karapetyants, *Drobnoe integrodifferencirovanie v gel'derovskih klassah peremennogo porjadka*, Doklady RAN, **339**: 4 (1994), 439–441.
- [38] B. Ross, S. G. Samko, *Fractional integration operator of a variable order in the Hölder spaces  $H^{\lambda(x)}$* , Internat. J. Math. Math. Sci., **18** (1995), 777–788.
- [39] B. G. Vakulov, *Sfericheskie operatory tipa potenciala v vesovyh prostranstvah Gjol'dera peremennogo porjadka*, Vladikavkazskij matematicheskij zhurnal, **7**: 2 (2005), 26–40.
- [40] B. G. Vakulov, *Spherical potentials in weighted Hölder spaces of variable order*, Doklady Mathematics, **71**: 1 (2005), 1–14.
- [41] B. G. Vakulov, *Spherical potentials of complex order in the variable order Hölder spaces*, Integral Transforms and Special Functions, **16**: 5-6 (2005), 489–497.

- [42] B. G. Vakulov, *Spherical convolution operators in spaces of variable Hölder order*, Mathematical Notes, **80**: 5–6 (2006), 645–657.
- [43] B. G. Vakulov, Yu. E. Drobotov, *Riesz potential with integrable density in Hölder-variable spaces*, Mathematical Notes, **108**:5 (2020), 669–678.
- [44] B. G. Vakulov, *Spherical potentials of complex order in generalized Hölder spaces of variable order*, Doklady Akademii Nauk, **407**:1 (2006), 12–15.
- [45] N. Samko, B. Vakulov, *Spherical fractional and hypersingular integrals of variable order in generalized Hölder spaces with variable characteristic*, Mathematische Nachrichten, **284**: 2–3 (2011), 355–369.
- [46] B. G. Vakulov, Yu. E. Drobotov, *Variable order Riesz potential over  $\mathbb{R}^n$  on weighted generalized variable Hölder spaces*, Sibirskie Elektronnye Matematicheskie Izvestiya, **14** (2017), 647–656.
- [47] B. G. Vakulov, N. G. Samko, S. G. Samko, *Operatory tipa potencijala i gipersingulyarnye integraly v prostranstvah Gyol'dera peremennogo porjadka na odnorodnyh prostranstvah*, Izv. vuzov. Sev. Kavk. region. Estestv. nauki. Specvypusk, (2009), 40–45.
- [48] N. Samko, S. Samko, B. Vakulov, *Fractional integrals and hypersingular integrals in variable order Hölder spaces on homogeneous spaces*, Journal of Function Spaces and Applications, **8**:3 (2010), 215–244.
- [49] S. G. Samko, *Potential operators in generalized Hölder spaces on sets in quasi-metric measure spaces without the cancellation property*, Nonlinear Analysis, **78** (2013), 130–140.
- [50] M. L. Gol'dman, E. G. Bakhtigareeva, *Application of general approach to the theory of Morrey-type spaces*, Mathematical Methods in the Applied Sciences, **43**:16 (2020), 9435–9447.
- [51] S. G. Samko, S. M. Umarchadzhiev, *Grand Morrey type spaces*, Vladikavkaz Mathematical Journal, **22**:4 (2020), 104–118.
- [52] A. Karapetyants, S. Samko, *Variable order fractional integrals in variable generalized Hölder spaces of holomorphic functions*, Analysis and Mathematical Physics, **11**:156 (2021).
- [53] V. I. Burenkov, M. A. Senouci, *Boundedness of the generalized Riesz potential in local Morrey type spaces*, Eurasian Mathematical Journal, **12**:4 (2021), 92–98.
- [54] V. I. Burenkov, E. D. Nursultanov, *Interpolation theorems for nonlinear operators in general Morrey-type spaces and their applications*, Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics [this link is disabled](#), **312**:1 (2021), 124–149.
- [55] I. Ekincioglu, S. M. Umarchadzhiev, *Oscillatory integrals with variable Calderon-Zygmund kernel on generalized weighted Morrey spaces*, Transactions Issue Mathematics, Azerbaijan National Academy of Sciences, **42**:1 (2022), 99–110.
- [56] S. M. Umarchadzhiev, *Generalization of a notion of grand Lebesgue space*, Russian Math. (Iz. VUZ), **58**:4 (2014), 35–43.
- [57] S. M. Umarchadzhiev, Yu. E. Drobotov, *Riesz potential in generalized grand Lebesgue space*, Bulletin of the Academy of Sciences of the Chechen Republic, **4**(29) (2015), 26–29.
- [58] Yu. E. Drobotov, S. M. Umarchadzhiev, *Riesz potential with homogeneous kernel in grand Lebesgue spaces on semi-axis*, Bulletin of the Academy of Sciences of the Chechen Republic, **1**(38) (2018), 18–25.

- [59] S. M. Umarkhadzhiev, *On elliptic homogeneous differential operators in grand spaces*, Russian Mathematics, **64**:3 (2020), 57–65.
- [60] S. M. Umarkhadzhiev, *Unilateral ball potentials in grand Lebesgue spaces*, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, **357** (2021), 569–576.
- [61] S. G. Samko, S. M. Umarkhadzhiev, *Local grand Lebesgue spaces*, Vladikavkaz Mathematical Journal, **23**:4 (2021), 96–108.
- [62] S. G. Samko, S. M. Umarkhadzhiev, *Weighted Hardy operators in grand Lebesgue spaces on  $\mathbb{R}^n$* , J Math Sci (2022)
- [63] H. Rafeiro, S. Samko, S. Umarkhadzhiev, *Grand Lebesgue space for  $p = \infty$  and its application to Sobolev–Adams embedding theorems in borderline cases*, Mathematische Nachrichten, **295**: 5 (2022), 991–1007.
- [64] H. Rafeiro, S. Samko, S. Umarkhadzhiev, *Local grand Lebesgue spaces on quasi-metric measure spaces and some applications*, Positivity, **26**: 3 (2022), 53.
- [65] S. M. Umarkhadzhiev, *Embedding of grand central Morrey-type spaces into local grand weighted Lebesgue spaces*, J Math Sci (2022)
- [66] V. N. Berestovskii, *Submetries of space-forms of negative curvature*, Siberian Mathematical Journal, **28** (1987), 552–562.
- [67] W. Rudin, *Principles of mathematical analysis*, McGraw–Hill, 1976.
- [68] S. L. Sobolev, *Vvedenie v teoriyu kubaturnyh formul*, Nauka, Moscow, 1974.

YURI EVGENIEVICH DROBOTOV

INSTITUTE OF MATHEMATICS, MECHANICS AND COMPUTER SCIENCES NAMED AFTER I. I. VOROVICH,  
 UL. MILCHAKOVA, 8A,  
 344090, ROSTOV-ON-DON, RUSSIA  
 NORTH-CAUCASUS CENTER FOR MATHEMATICAL RESEARCH OF THE VLADIKAVKAZ SCIENTIFIC  
 CENTRE OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES,  
 UL. VIL'YAMSA, 1,  
 363110, RSO-ALANIYA, PRIGORODNYJ RAJON, s.MIHAILOVSKOE, RUSSIA  
 DON STATE TECHNICAL UNIVERSITY,  
 GAGARINA SQU., 1,  
 344000, ROSTOV-ON-DON, RUSSIA  
*Email address: yu.e.drobotov@yandex.ru*

BORIS GRIGORIEVICH VAKULOV

INSTITUTE OF MATHEMATICS, MECHANICS AND COMPUTER SCIENCES NAMED AFTER I. I. VOROVICH,  
 MILCHAKOVA STR., 8A,  
 344090, ROSTOV-ON-DON, RUSSIA  
*Email address: bvak1961@bk.ru*