

СИБИРСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Siberian Electronic Mathematical Reports

<http://semr.math.nsc.ru>

Том 12, стр. 144–144 (2015)

DOI 10.17377/semi.2015.12.xxx

УДК 519.17

MSC 05C25

ДИСТАНЦИОННО РЕГУЛЯРНЫЙ ГРАФ С МАССИВОМ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ $\{143, 108, 27; 1, 12, 117\}$ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

А.А. Махнев, М.М. Исакова, А.А. Токбаева

ABSTRACT. There is a formally self-dual distance-regular graph Γ with classical parameters $d = 3$, $b = \alpha + 1 = q$, $\beta = q^2 + q - 1$ and intersection array $\{(q^2 + q - 1)(q^2 + q + 1), (q^2 + q)q^2, q^3; 1, (q^2 + q), q^2(q^2 + q + 1)\}$. For the graph Γ we have the strongly regular graphs Γ_2 and Γ_3 (Γ_3 is pseudo-geometric for $pG_{q-1}(q^2 + q - 1, (q^2 + q + 1)(q - 1))$).

It is proved that a distance-regular graph with intersection array $\{143, 108, 27; 1, 12, 117\}$ ($q = 3$) does not exist.

Keywords: distance-regular graph, formally self-dual graph, triple intersection numbers.

Мы рассматриваем неориентированные графы без петель и кратных ребер. Для вершины a графа Γ через $\Gamma_i(a)$ обозначим i -окрестность вершины a , то есть, подграф, индуцированный Γ на множестве всех вершин, находящихся на расстоянии i от a . Положим $[a] = \Gamma_1(a)$, $a^\perp = \{a\} \cup [a]$.

Пусть Γ — граф диаметра d , $i \in \{2, 3, \dots, d\}$. Граф Γ_i имеет то же самое множество вершин, и вершины u, w смежны в Γ_i , если $d_\Gamma(u, w) = i$.

Если вершины u, w находятся на расстоянии i в Γ , то через $b_i(u, w)$ (через $c_i(u, w)$) обозначим число вершин в пересечении $\Gamma_{i+1}(u)$ ($\Gamma_{i-1}(u)$) с $[w]$. Граф Γ диаметра d называется *дистанционно регулярным с массивом пересечений* $\{b_0, b_1, \dots, b_{d-1}; c_1, \dots, c_d\}$, если значения $b_i(u, w)$ и $c_i(u, w)$ не зависят от выбора вершин u, w на расстоянии i в Γ для любого $i = 0, \dots, d$. Положим $a_i = k - b_i - c_i$. Заметим, что для дистанционно регулярного графа b_0 — это

МАХНЕВ, А.А., ИСАКОВА М.М., ТОКБАЕВА А.А., DISTANCE-REGULAR GRAPH WITH INTERSECTION ARRAY $\{143, 108, 27; 1, 12, 117\}$ DOES NOT EXIST.

© 2021 МАХНЕВ А.А., ИСАКОВА М.М., ТОКБАЕВА А.А..

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ГФЕН Китая в рамках научного проекта №20-51-53013.

Поступила 16 октября 2021 г., опубликована ?? декабря 2022 г.

степень графа, $c_1 = 1$. Далее, через $p_{ij}^l(x, y)$ обозначим число вершин в подграфе $\Gamma_i(x) \cap \Gamma_j(y)$ для вершин x, y , находящихся на расстоянии l в графе Γ . В дистанционно регулярном графе числа $p_{ij}^l(x, y)$ не зависят от выбора вершин x, y , обозначаются p_{ij}^l и называются числами пересечений графа Γ [1].

Дистанционно регулярный граф называется формально самодуальным, если первая $P = (P_{ij})$ и вторая $Q = (Q_{ij})$ матрицы его собственных значений совпадают.

Связный неполный граф Γ называется графом Тервиллигера (с параметром μ), если для любых двух вершин u, w на расстоянии 2 подграф $[u] \cap [w]$ является μ -кликкой.

В [2] Юришич и Видали рассматривли дистанционно регулярные графы с классическими параметрами d, b, α, β и $b = \alpha + 1$ или $b = \alpha$. Они доказали, что дистанционно регулярные графы с классическими параметрами $d, b, b - 1, b^{d-1}$ являются d -кубами.

Q -полиномиальный дистанционно регулярный граф Γ диаметра 3 с сильно регулярными графами Γ_2 и Γ_3 имеет массив пересечений $\{t(c_2 + 1) + a_3, tc_2, a_3 + 1; 1, c_2, t(c_2 + 1)\}$, где $(t^2 - a_3 - 1)(c_2 + 1) = a_3(a_3 + 1)$ [3]. Положим $a = a_3$. Скажем, что Γ — граф типа (I), если $c_2 + 1$ делит a , Γ — граф типа (II), если $c_2 + 1$ делит $a + 1$, Γ — граф типа (III), если $c_2 + 1$ не делит a и не делит $a + 1$. Доказательство несуществования небольших графов типа (III) получено в [4].

Граф Γ типа (I) является формально самодуальным. Если этот граф имеет классические параметры d, b, α, β , то $d = 3, b = \alpha + 1 = q, \beta = q^2 + q - 1$ и Γ имеет массив пересечений $\{(q^2 + q - 1)(q^2 + q + 1), (q^2 + q)q^2, q^3; 1, (q^2 + q), q^2(q^2 + q + 1)\}$. Далее, Γ имеет собственные значения $q^4 + 2q^3 + q^2 - 1, q^3 + q^2 - 1, -1, -(q^2 + q + 1)$ кратностей $1, (q^2 + q + 1)(q^2 + q - 1), (q^2 + q + 1)(q^2 + q - 1)q^2, (q^2 + q - 1)q^3$ соответственно.

При $q = 2$ получим массив пересечений $\{35, 24, 8; 1, 6, 28\}$, а при $q = 3$ — $\{143, 108, 27; 1, 12, 117\}$. С помощью тройных чисел пересечений в [5] было доказано, что первый граф не существует.

Теорема 1. *Дистанционно регулярный граф с массивом пересечений {143, 108, 27; 1, 12, 117} не существует.*

В доказательстве теоремы 1 используются тройные числа пересечений [5].

Пусть Γ — дистанционно регулярный граф диаметра d . Если u_1, u_2, u_3 — вершины графа Γ , r_1, r_2, r_3 — неотрицательные целые числа, не большие d , то $\left\{ \begin{matrix} u_1 u_2 u_3 \\ r_1 r_2 r_3 \end{matrix} \right\}$ — множество вершин $w \in \Gamma$ таких, что $d(w, u_i) = r_i, \left[\begin{matrix} u_1 u_2 u_3 \\ r_1 r_2 r_3 \end{matrix} \right] = \left| \left\{ \begin{matrix} u_1 u_2 u_3 \\ r_1 r_2 r_3 \end{matrix} \right\} \right|$. Числа $\left[\begin{matrix} u_1 u_2 u_3 \\ r_1 r_2 r_3 \end{matrix} \right]$ называются тройными числами пересечений. Для фиксированной тройки вершин u_1, u_2, u_3 вместо $\left[\begin{matrix} u_1 u_2 u_3 \\ r_1 r_2 r_3 \end{matrix} \right]$ будем писать $[r_1 r_2 r_3]$. К сожалению, для чисел $[r_1 r_2 r_3]$ нет общих формул. Однако, в [5] изложен метод вычисления некоторых чисел $[r_1 r_2 r_3]$.

Пусть u, v, w — вершины графа $\Gamma, W = d(u, v), U = d(v, w), V = d(u, w)$. Так как имеется точно одна вершина $x = u$ такая, что $d(x, u) = 0$, то число $[0jh]$ равно 0 или 1. Отсюда $[0jh] = \delta_{jW} \delta_{hV}$. Аналогично, $[i0h] = \delta_{iW} \delta_{hU}$ и $[ij0] = \delta_{iU} \delta_{jV}$.

Другое множество уравнений можно получить, фиксируя расстояние между двумя вершинами из $\{u, v, w\}$, и сосчитав число вершин всех расстояний от третьей, получим:

$$\begin{cases} \sum_l^d [ljh] = p_{jh}^U - [0jh] \\ \sum_l^d [ilh] = p_{ih}^V - [i0h] \\ \sum_l^d [ijl] = p_{ij}^W - [ij0] \end{cases} \quad (+)$$

При этом некоторые тройки исчезают. При $|i-j| > W$ или $i+j < W$ имеем $p_{ij}^W = 0$, поэтому $[ijh] = 0$ для всех $h \in \{0, \dots, d\}$.

Положим $S_{ijh}(u, v, w) = \sum_{r,s,t=0}^d Q_{ri} Q_{sj} Q_{th} \begin{bmatrix} uvw \\ rst \end{bmatrix}$. Если параметр Крейна $q_{ij}^h = 0$, то $S_{ijh}(u, v, w) = 0$.

Пусть Γ — дистанционно регулярный граф с массивом пересечений $\{143, 108, 27; 1, 12, 117\}$. Тогда Γ имеет $1 + 143 + 1287 + 297 = 1728$ вершин, спектр $143^1, 35^{143}, -1^{1287}, -13^{297}$, вторую матрицу собственных значений

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 143 & 1287 & 297 \\ 1 & 35 & -9 & -27 \\ 1 & -1 & -9 & 9 \\ 1 & -13 & 39 & -27 \end{pmatrix},$$

и числа пересечений

- (1) $p_{11}^1 = 34, p_{21}^1 = 108, p_{22}^1 = 936, p_{32}^1 = 243, p_{33}^1 = 54;$
- (2) $p_{11}^2 = 12, p_{21}^2 = 104, p_{22}^2 = 966, p_{31}^2 = 27, p_{32}^2 = 216, p_{33}^2 = 54;$
- (3) $p_{21}^3 = 117, p_{22}^3 = 936, p_{31}^3 = 26, p_{32}^3 = 234, p_{33}^3 = 36.$

Отсюда граф Γ_2 сильно регулярен с параметрами $(1728, 1287, 966, 936)$, а Γ_3 сильно регулярен с параметрами $(1728, 297, 36, 54)$. Ввиду границы Дельсарта порядок клики в Γ не больше $1 + 143/13 = 12$.

Для вершин u, v, w графа Γ положим $[rst] = \begin{bmatrix} uvw \\ rst \end{bmatrix}$.

Лемма 1. Пусть $d(u, v) = d(u, w) = d(v, w) = 2$. Тогда для тройных чисел пересечений выполняются равенства:

$$\begin{aligned} [111] &= r_{11}, [112] = r_{10} - r_7 - 2r_8 - r_9/8 + 861/8, [113] = -r_{10} + r_7 + 2r_8 + r_9/8 - 765/8, \\ [121] &= -r_{11} - r_8 + 12, [122] = -4r_{10} + 2r_7 + 6r_8 + r_9/8 - 245/8, \\ [123] &= 4r_{10} + r_{11} - 2r_7 - 5r_8 - r_9/8 + 981/8, [131] = r_8, [132] = 3r_{10} - r_7 - 4r_8 + 27, \\ [133] &= -3r_{10} + r_7 + 3r_8; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [211] &= -r_{10} - r_{11} + 12, [212] = 2r_7 + 2r_8 + r_9/8 - 245/8, [213] = r_{10} + r_{11} - 2r_7 - 2r_8 - r_9/8 + 981/8, \\ [221] &= 4r_{10} + 4r_{11} - 2r_7 - 2r_8 - 3r_9/8 + 2815/8, [222] = r_9, [223] = -4r_{10} - 4r_{11} + 2r_7 + 2r_8 - 5r_9/8 + 4905/8, \\ [231] &= -3r_{10} - 3r_{11} + 2r_7 + 2r_8 + 3r_9/8 - 2079/8, [232] = -2r_7 - 2r_8 - 9r_9/8 + 7965/8, [233] = 3r_{10} + 3r_{11} + 3r_9/4 - 2079/4; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [311] &= r_{10}, [312] = -r_{10} - r_7 + 27, [313] = r_7, [321] = -4r_{10} - 3r_{11} + 2r_7 + 3r_8 + 3r_9/8 - 2079/8, \\ [322] &= 4r_{10} - 2r_7 - 6r_8 - 9r_9/8 + 7965/8, [323] = 3r_{11} + 3r_8 + 3r_9/4 - 2079/4, \\ [331] &= 3r_{10} + 3r_{11} - 2r_7 - 3r_8 - 3r_9/8 + 2295/8, [332] = -3r_{10} + 3r_7 + 6r_8 + 9r_9/8 - 6453/8, \\ [333] &= -3r_{11} - r_7 - 3r_8 - 3r_9/4 + 2295/4, \end{aligned}$$

где $r_7 \in \{0, 1, \dots, 27\}$, $r_9 \in \{645, 653, \dots, 765\}$, $r_8, r_{10}, r_{11} \in \{0, 1, \dots, 12\}$, r_9 сравнимо с 5 по модулю 8.

Доказательство. Решая систему линейных уравнений (+) со свободными неизвестными $r_7 = [313]$, $r_8 = [131]$, $r_9 = [222]$, $r_{10} = [311]$, $r_{11} = [111]$, получим требуемые равенства. Из равенства $[112] = r_{10} - r_7 - 2r_8 - r_9/8 + 861/8$ следует, что r_9 сравнимо с 5 по модулю 8. \square

Заметим, что $[112] + [113] = 12$, поэтому (с учетом равенства $c_2 = 12$) имеем $r_{11} = 0$. Отсюда окрестность любой вершины в Γ не содержит 3-клик (и не содержит 3-лап). Покажем, что Γ является графом Тервиллигера. Действительно, если $[u] \cap [v]$ содержит две несмежные вершины y_1, y_2 , и $y_3 \in \Gamma_3(u) \cap [v]$, то $\{y_1, y_2, y_3\}$ является 3-кликой из $[v]$, противоречие.

В графе Тервиллигера $\{u\} \cup ([u] \cap [v])$ является 13-кликой, противоречие с границей Дельсарта.

Теорема 1 доказана.

REFERENCES

- [1] A.E. Brouwer, A.M. Cohen, A. Neumaier, *Distance-Regular Graphs*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1989.
- [2] A. Jurishich, J. Vidali, *Restrictions on classical distance-regular graphs*, J. Algebr. Comb., **46:3-4** (2017), 571–588.
- [3] Belousov I.N., Makhnev A.A., Nirova M.S. *On Q -polynomial distance-regular graphs Γ with strongly regular graphs Γ_2 and Γ_3* , Siberian Electronic Mathematical Reports, **16** (2019), 1358–1365.
- [4] Makhnev A.A., Isakova M.M., Tokbaeva A.A. *The nonexistence of small Q -polynomial graphs of type (III)*, Siberian Electronic Mathematical Reports, **17** (2020), 1270–1279.
- [5] A. Jurishich, J. Vidali, *Extremal 1-codes in distance-regular graphs of diameter 3*, Des. Codes Cryptogr., **65** (2012), 29–47.

ALEKSANDR ALEKSEEVICH MAKHNEV
 N.N. KRASOVSKII INSTITUTE OF MATHEMATICS AND MECHANICS
 OF THE URAL BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES,
 STR. S.KOVALEVSKAYA, 16,
 620990, YEKATERINBURG, RUSSIA
E-mail address: makhnev@imm.uran.ru

MARIANA MALILOVNA ISAKOVA
 KABARDINO-BALKARIAN STATE UNIVERSITY NAMED AFTER H.M. BERBEKOV,
 STR. CHERNYSHEVSKY, 175,
 360004, NALCHIK, RUSSIA
E-mail address: isakova2206@mail.ru

ALBINA ANIUVAROVNA TOKBAEVA
 KABARDINO-BALKARIAN STATE UNIVERSITY NAMED AFTER H.M. BERBEKOV,
 STR. CHERNYSHEVSKY, 175,
 360004, NALCHIK, RUSSIA
E-mail address: tok2506@mail.ru