

СИБИРСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ  
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Siberian Electronic Mathematical Reports

<http://semr.math.nsc.ru>

---

*Том 16, стр. 144–144 (2019)*  
DOI 10.33048/semi.2019.16.xxxУДК 519.716  
MSC 08A99О СУБМАКСИМАЛЬНЫХ УЛЬТРАКЛОНАХ  
САМОДВОЙСТВЕННЫХ ГИПЕРФУНКЦИЙ РАНГА 2

С.А. БАДМАЕВ, И.К. ШАРАНХАЕВ

ABSTRACT. In article the elements of the lattice of ultraclones are considered. We proved the criterion of completeness in the maximal ultracclone of self-dual hyperfunctions. Thus, all submaximal ultraclones of self-dual hyperfunctions are described.

**Keywords:** hyperfunction, Boolean function, self-dual function, superposition, closed set, ultracclone, lattice.

## 1. ВВЕДЕНИЕ

В теории дискретных функций классической проблемой является описание структуры или решетки замкнутых классов (клонов) функций. Как известно, только для булевых функций решетка замкнутых классов полностью описана и является счетной [1]. Для остальных функций  $k$ -значной логики данная задача далека от своего завершения.

В данной работе исследуется решетка замкнутых классов гиперфункций ранга 2, так называемых ультраклонов ранга 2. Так как все максимальные ультраклоны ранга 2 найдены В.И. Пантелеевым в [2], актуальной задачей является описание следующего яруса в решетке ультраклонов, т. е. субмаксимальных ультраклонов. В статье найден критерий полноты в максимальном ультраклоне самодвойственных гиперфункций, как следствие, получено описание всех субмаксимальных ультраклонов самодвойственных гиперфункций.

Заметим, что описание всех субмаксимальных клонов помимо булевых функций получено лишь для функций трехзначной логики [3].

---

BADMAEV, S.A., SHARANKHAEV, I.K. ON SUBMAXIMAL ULTRACLONES OF SELF-DUAL HYPERFUNCTIONS OF RANK 2.

© 2021 Бадмаев С.А., Шаранхаев И.К..

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №22–21–20013, <https://rscf.ru/project/22-21-20013/> и Правительства Республики Бурятия.

Поступила 1 января 2015 г., опубликована 31 декабря 2015 г.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Пусть  $E = \{0, 1\}$  и  $F = \{\{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$ . Определим следующие множества функций:

$$P_{2,n} = \{f | f : E^n \rightarrow E\}, P_2 = \bigcup_n P_{2,n};$$

$$P_{2,n}^- = \{f | f : E^n \rightarrow F\}, P_2^- = \bigcup_n P_{2,n}^-;$$

Функции из  $P_2$  называют булевыми функциями, из  $P_2^-$  – гиперфункциями на  $E$  (гиперфункциями ранга 2).

Для того, чтобы суперпозиция

$$f(f_1(x_1, \dots, x_m), \dots, f_n(x_1, \dots, x_m)),$$

где  $f, f_1, \dots, f_n \in P_2^-$ , определяла гиперфункцию  $g(x_1, \dots, x_m)$  определим значения гиперфункции  $f$  на наборах из множества  $F$  следующим образом: если  $(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in E^m$ , то

$$g(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \begin{cases} \bigcap_{\beta_i \in f_i(\alpha_1, \dots, \alpha_m)} f(\beta_1, \dots, \beta_n), & \text{если пересечение не пусто;} \\ \bigcup_{\beta_i \in f_i(\alpha_1, \dots, \alpha_m)} f(\beta_1, \dots, \beta_n), & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Далее гиперфункцию будем называть просто функцией, если это не вызывает недоразумений.

Для любого натурального  $n$  и любого  $i$ , где  $1 \leq i \leq n$ , обозначим через  $e_i^n(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$  функцию, значения которой совпадают со значениями переменной  $x_i$ . Функции  $e_i^n$  называются проекциями или селекторными функциями.

Замыканием множества функций  $K$  называется множество всех функций, полученных из функций множества  $K$  с помощью суперпозиции, добавления и удаления фиктивных переменных. Замыкание множества  $K$  обозначается через  $[K]$ . Множество функций  $K$  называется замкнутым (замкнутым классом), если  $K = [K]$ .

Ультраклоном ранга 2 (клоном) называется замкнутое множество гиперфункций ранга 2 (булевых функций), содержащее все проекции. Далее для краткости любой ультраклон ранга 2 будем называть просто ультраклоном. Заметим, что любой клон является ультраклоном.

Ультраклон  $K$  называется максимальным, если не существует ультраклона  $K'$  такого, что  $K \subset K' \subset P_2^-$ .

Ультраклон  $K$  называется субмаксимальным, если не существует ультраклона  $K'$  такого, что  $K \subset K' \subset M$ , где  $M$  – некоторый максимальный ультраклон.

Через  $S$  обозначим клон всех булевых самодвойственных функций.

Пусть  $R^s$  –  $s$ -местный предикат, заданный на множестве  $F$ . Будем говорить, что функция  $f(x_1, \dots, x_n)$ , определенная на множестве  $F$ , сохраняет предикат  $R^s$ , если для любых наборов

$$(\alpha_{11}, \dots, \alpha_{s1}), \dots, (\alpha_{1n}, \dots, \alpha_{sn}),$$

принадлежащих предикату  $R^s$ , набор

$$(f(\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1n}), \dots, f(\alpha_{s1}, \dots, \alpha_{sn}))$$

принадлежит  $R^s$ .

Для упрощения записи используется кодировка:  $\{0\} \leftrightarrow 0$ ,  $\{1\} \leftrightarrow 1$ ,  $\{0, 1\} \leftrightarrow -$ , тогда  $F = \{0, 1, -\}$ .

Гиперфункцию, которая на всех наборах принимает значение  $-$ , будем обозначать просто  $-$ .

В [2] доказано, что максимальными ультраклонами ранга 2 являются только следующие 11 множеств:

- 1)  $P_2$  – множество всех булевых функций;
- 2)  $T_0^-$  – множество функций, которые сохраняют нуль, т. е. на наборе из всех нулей функции принимают значение 0;
- 3)  $T_1^-$  – множество функций, которые сохраняют единицу, т. е. на наборе из всех единиц функции принимают значение 1;
- 4)  $S^-$  – множество функций, сохраняющих предикат

$$R_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & - \\ 1 & 0 & - \end{pmatrix};$$

- 5)  $L^-$  – множество функций, сохраняющих предикат

$$R_L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & - \\ 0 & 1 & 0 & 1 & - \end{pmatrix};$$

- 6)  $M^-$  – множество функций, сохраняющих предикат

$$R_M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & - & - \\ 0 & 1 & 1 & - & 1 & - \end{pmatrix};$$

- 7)  $A_1$  – множество функций, сохраняющих предикат

$$R_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & - & 1 & - \\ 1 & 0 & 1 & 1 & - & - \end{pmatrix};$$

- 8)  $A_2$  – множество функций, сохраняющих предикат

$$R_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & - & - \\ 0 & 1 & 0 & - & 0 & - \end{pmatrix};$$

- 9)  $A_3$  – множество функций, сохраняющих предикат  $R_3$ , определяемый матрицей

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & - & - & 0 & 1 & - & - & 1 & 1 & - & - \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & - & 1 & - & 0 & 1 & - & - & 1 & - & 1 & - & 1 & - \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & - & 0 & - & 1 & 1 & 0 & - & - & - & 1 & - & 1 & 1 & - \end{pmatrix};$$

- 10)  $A_4$  – множество функций, сохраняющих предикат

$$R_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & - & 0 & - & - & - \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & - & 0 & - & 0 & - & - \\ 0 & 1 & 0 & 1 & - & 0 & 0 & - & - & 0 & - \end{pmatrix};$$

- 11)  $A_5$  – множество, состоящее из всех функций, существенно зависящих не более чем от одной переменной, а также из функций, принимающих два значения, одно из которых есть  $-$ .

Множество  $S^-$  будем называть множеством всех самодвойственных гиперфункций ранга 2.

Через  $d_3$  обозначим функцию, задаваемую вектором (00010111).

Множество  $B$  называется полным в  $S^-$ , если  $[B] = S^-$ .

Через  $K_1$  обозначим множество  $S^- \cap T_0^-$ , через  $K_2$  – множество  $S^- \cap L^-$ , через  $K_3$  – множество  $S^- \cap M^-$ .

Все определения, которые отсутствуют здесь, необходимые для понимания статьи, можно найти в [2, 4].

### 3. КРИТЕРИЙ ПОЛНОТЫ И ОПИСАНИЕ СУБМАКСИМАЛЬНЫХ УЛЬТРАКЛОНОВ В МНОЖЕСТВЕ ВСЕХ САМОДВОЙСТВЕННЫХ ГИПЕРФУНКЦИЙ

В этом разделе доказывается критерий полноты в  $S^-$ , как следствие, описаны все субмаксимальные ультраклоны, содержащиеся в  $S^-$ .

**Лемма 1.** [4] *Множество  $S$  является замкнутым.*

**Лемма 2.** *Множества  $K_1, K_2, K_3$  являются замкнутыми.*

*Доказательство.* Очевидно, в силу замкнутости множеств  $S^-, T_0^-, L^-, M^-$ , что доказано в [2]. □

В [5] доказана следующая

**Лемма 3.** *Верно, что  $S^- = [\{d_3, \bar{x}, -\}]$ .*

**Лемма 4.** [2] *Гиперфункция  $f \in L^-$  тогда и только тогда, когда  $f$  – линейная булева функция или константа  $-$ .*

**Лемма 5.** *Булева функция  $f(x_1, \dots, x_n)$  является линейной тогда и только тогда, когда для любой существенной переменной  $x_i$  при любых значениях  $a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n$  для переменных  $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$*

$$f(a_1, \dots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \dots, a_n) \neq f(a_1, \dots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \dots, a_n).$$

*Доказательство.* Необходимость. Очевидно, в силу

$$f = c_1 x_1 \oplus \dots \oplus c_{i-1} x_{i-1} \oplus x_i \oplus c_{i+1} x_{i+1} \oplus \dots \oplus c_n x_n \oplus c_0,$$

где  $c_j \in \{0, 1\}$ .

Достаточность. От противного. Пусть  $f$  не является линейной. Тогда, не умаляя общности, можно считать, что

$$f = x_1 x_2 p_0(x_3, \dots, x_n) \oplus x_1 p_1(x_3, \dots, x_n) \oplus x_2 p_2(x_3, \dots, x_n) \oplus p_3(x_3, \dots, x_n),$$

где найдется набор  $(b_3, \dots, b_n)$  такой, что  $p_0(b_3, \dots, b_n) = 1$ . Тогда

$$f(0, 0, b_3, \dots, b_n) = p_3(b_3, \dots, b_n),$$

$$f(0, 1, b_3, \dots, b_n) = p_2(b_3, \dots, b_n) \oplus p_3(b_3, \dots, b_n),$$

$$f(1, 0, b_3, \dots, b_n) = p_1(b_3, \dots, b_n) \oplus p_3(b_3, \dots, b_n),$$

$$f(1, 1, b_3, \dots, b_n) = p_0(b_3, \dots, b_n) \oplus p_1(b_3, \dots, b_n) \oplus p_2(b_3, \dots, b_n) \oplus p_3(b_3, \dots, b_n).$$

Отсюда  $p_1(b_3, \dots, b_n) = p_2(b_3, \dots, b_n) = 1$ , а значит  $p_0(b_3, \dots, b_n) = 0$ . Противоречие. □

**Теорема 1.** *Множество  $B \subseteq S^-$  является полным в  $S^-$  тогда и только тогда, когда  $B \not\subseteq S, B \not\subseteq K_1, B \not\subseteq K_2, B \not\subseteq K_3$ .*

*Доказательство.* Необходимость. От противного. Пусть  $B \subseteq S$ . В случаях  $B \subseteq K_1$ ,  $B \subseteq K_2$ ,  $B \subseteq K_3$  доказывается аналогично с помощью леммы 2. Тогда  $[B] \subseteq S$ . Противоречие лемме 1.

Достаточность. Так как  $B \not\subseteq K_1$  найдется  $f_1 \notin K_1$ . Возможны 2 случая:

Случай 1. Пусть  $f_1(0, \dots, 0) = 1$ . Тогда  $f(x) = f_1(x, \dots, x) = (10)$ . Так как  $B \not\subseteq S$  найдется  $f_2 \notin S$ . Из  $f_2$  отождествлением переменных и подстановкой отрицаний получим  $f_3 = (-)$ .

Случай 2. Пусть  $f_1(0, \dots, 0) = -$ . Из  $f_1$  отождествлением переменных получим  $f_3 = (-)$ .

Таким образом, имеем константу  $-$ .

Покажем, что всегда получим функцию  $d_3$ .

Так как  $B \not\subseteq K_2$  найдется  $g_1 \notin K_2$ . В силу леммы 4 возможны 3 случая:

Случай 1. Отождествлением переменных из  $g_1$  получим  $g_2 = (0 - -1)$  или  $(1 - -0)$ . Но так как во втором варианте сразу имеем отрицание, поэтому достаточно рассмотреть только первый вариант. Добавив фиктивную переменную получим  $g_3 = (0 - -10 - -1)$ . Далее построим  $g_4 = g_3(e_1^3, e_1^3, g_3) = (000 - -111)$ . С помощью  $g_4$  получим функцию  $d_3 = g_3(e_1^3, g_3, g_4) = (00010111)$ .

Случай 2. Отождествлением переменных из  $g_1$  получим  $g_5 = (-10-)$  или  $(-01-)$ . Так как первая функция получается из второй перестановкой переменных, достаточно рассмотреть только первый вариант. Далее получим  $g_6 = g_5(e_1^2, g_5) = (1100)$ , т. е. отрицание. С помощью отрицания из  $g_5$  получаем  $g_2$ , т. е. эта ситуация сводится к случаю 1.

Случай 3. Функция  $g_1$  является булевой нелинейной самодвойственной. По лемме 5 найдутся существенная переменная  $x_i$  и значения

$$a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n$$

для переменных  $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$  такие, что

$$g_1(a_1, \dots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \dots, a_n) = g_1(a_1, \dots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \dots, a_n).$$

Поскольку  $x_i$  является существенной, то существуют значения

$$b_1, \dots, b_{i-1}, b_{i+1}, \dots, b_n$$

для переменных  $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$  такие, что

$$g_1(b_1, \dots, b_{i-1}, 0, b_{i+1}, \dots, b_n) \neq g_1(b_1, \dots, b_{i-1}, 1, b_{i+1}, \dots, b_n).$$

Следовательно,

$$g_1(a_1, \dots, a_{i-1}, -, a_{i+1}, \dots, a_n) = c,$$

где  $c \in \{0, 1\}$  и

$$g_1(b_1, \dots, b_{i-1}, -, b_{i+1}, \dots, b_n) = -.$$

Отождествлением переменных из

$$g_1(x_1, \dots, x_{i-1}, -, x_{i+1}, \dots, x_n)$$

получим одну из функций  $(0 - -1)$ ,  $(1 - -0)$ ,  $(-10-)$ ,  $(-01-)$ , т. е. ситуация сводится к случаям 1 и 2.

Итак, получили функцию  $d_3$ .

Покажем, что всегда получим отрицание  $(10)$ .

Так как  $B \not\subseteq K_3$  найдется  $h_1 \notin K_3$ . Очевидно, что отождествлением переменных из  $h_1$  получим самодвойственную гиперфункцию от трех переменных  $h \notin K_3$ .

Если  $h(0, 0, 0) = 1$ , то сразу имеем отрицание.

Если  $h(0, 0, 0) = -$ , то отождествлением переменных из  $h$  получим  $(-10-)$  или  $(-01-)$ . Как было показано выше, с помощью любой из них получим отрицание.

Если  $h(0, 0, 0) = 0$ , то возможны 16 случаев:

Случай 1.  $h = (01001101)$ . Тогда

$$h_2(x_1, x_2, x_3) = h(h(x_1, x_2, x_3), d_3(x_1, x_2, x_3), -) = (-1 - 01 - 0-).$$

С помощью  $h_2$  получим функцию  $h_3 = h_2(x_1, x_1, x_3) = (-10-)$ . Из  $h_3$  получим отрицание  $h_4 = h_3(e_1^2, h_3) = (1100)$ .

В остальных случаях лишь запишем суперпозиции, которые дают ранее рассмотренные функции.

Случай 2.  $h = (00101011)$ ,  $h(x_1, x_3, x_2) = (01001101)$ .

Случай 3.  $h = (01110001)$ ,  $h(x_2, x_1, x_3) = (01001101)$ .

Случай 4.  $h = (01101001)$ ,  $h(e_2^3, e_1^3, d_3) = (00101011)$ .

Случай 5.  $h = (001 - -011)$ ,  $h(e_1^3, h, e_3^3) = (00101011)$ .

Случай 6.  $h = (00 - 01 - 11)$ ,  $h(h, e_2^3, e_3^3) = (00101011)$ .

Случай 7.  $h = (0 - 1010 - 1)$ ,  $h(e_1^3, e_1^3, h) = (00 - 01 - 11)$ .

Случай 8.  $h = (010 - -101)$ ,  $h(e_1^3, e_2^3, h) = (01001101)$ .

Случай 9.  $h = (011 - -001)$ ,  $h(e_2^3, e_1^3, h) = (01001101)$ .

Случай 10.  $h = (01 - 01 - 01)$ ,  $h(e_1^3, e_3^3, e_2^3) = (0 - 1010 - 1)$ .

Случай 11.  $h = (01 - 10 - 01)$ ,  $h(e_1^3, e_2^3, h) = (01110001)$ .

Случай 12.  $h = (0 - 1100 - 1)$ ,  $h(e_1^3, h, e_3^3) = (01110001)$ .

Случай 13.  $h = (0 - 1 - -0 - 1)$ ,  $h(e_1^3, e_1^3, h) = (00 - 01 - 11)$ .

Случай 14.  $h = (0 - 0011 - 1)$ ,  $h(e_1^3, e_3^3, e_2^3) = (00 - 01 - 11)$ .

Случай 15.  $h = (0 - -01 - -1)$ ,  $h(e_2^3, e_1^3, e_3^3) = (0 - 1 - -0 - 1)$ .

Случай 16.  $h = (01 - - - -01)$ ,  $h(e_1^3, e_3^3, e_2^3) = (0 - 1 - -0 - 1)$ .

Итак, получили отрицание (10). Заметим, что ранее мы получили  $d_3$  и константу  $-$ . Следовательно, по лемме 3 множество  $B$  полно в  $S^-$ . □

**Следствие 1.** *Существует ровно 4 субмаксимальных ультраклона  $S$ ,  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$ , содержащихся в  $S^-$ .*

## REFERENCES

- [1] E.L. Post, *Introduction to a General Theory of Elementary Proposition*, Amer. J. Math., **43**:4 (1921), 163–185.
- [2] V.I. Panteleyev, *Completeness Criterion for Predefined Boolean Functions (in Russian)*, Vestnik Samar. Gos. Univ. Est.-Naush. Ser., **2**:68 (2009), 60–79. <http://www.mathnet.ru/links/e18e8ae72878a5d55fb95d6337a2c/vsgu223.pdf>
- [3] D. Lau, *Function algebras on finite sets*, Springer, Berlin, 2006.
- [4] N.A. Peryazev, *Fundamentals of theory of Boolean functions*, Fizmatlit, M., 2000.
- [5] S.A. Badmaev, A.E. Dugarov, I.V. Fomina, I.K. Sharankhaev, *On some intervals in the lattice of ultraclasses of rank 2*, Siberian Electronic Mathematical Reports, **18**:2 (2021), 1210–1218. <http://semr.math.nsc.ru/v18/n2/p1210-1218.pdf>

SERGEI ALEXANDROVICH BADMAEV, IVAN KONSTANTINOVICH SHARANKHAEV  
DORZHI BANZAROV BURYAT STATE UNIVERSITY,  
24A, SMOLINA STR.,  
670000, ULAN-UDE, RUSSIA  
*E-mail address*: badmaevsa@mail.ru, goran5@mail.ru